ACCIÓN

Biesterfeld

Farm Agro
El compadre del agro

Herbicida agrícola
Concentrado soluble SL

COMPOSICIÓN:
Glyphosate, isopropylamine salt .....480 g/l
Aditivos ..... c.p.s 1 litro

MODO DE EMPLEO: ACCIÓN es un herbicida sistémico no selectivo, para su uso, en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **ACCIÓN** con un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar en bordes agrícolas en presencia de las malezas cuando estas estén en crecimiento activo con 1 a 5 hojas verdaderas (5 a 20 cm de altura).

PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Por su aplicación en bordes de áreas agrícolas no está determinada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con metales, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente Peligroso.
"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: "Puede ser mortal si se ingiere, venenoso si se inhala, puede ocasionar irritación a los ojos". "Evitar la inhalación de la sustancia nebulizada, el contacto directo con la boca, piel, ojos y la ingestión del mismo".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.
En caso de contacto con la piel: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Calambres estomacales, vómitos, náuseas, diarrea, dolor de boca y garganta.

TRATAMIENTO: Lavado gástrico y carbón activado, pero se puede aplicar tratamiento SINTOMÁTICO Y DE SOPORTE.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800–VENENO (836366) Atención 24 horas del día.
Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.
Medidas relativas para la protección del ambiente: "Es peligroso para peces no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "No emplear este envase para ningún otro fin". "No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas". "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo".
"En los lugares aplicados no debe alimentarse el ganado, ni alimentarlo con los restos de cultivos tratados".

PRESENTACIONES:
Frasco x 500 ml
Frasco x 1 litro
Frasco x 3.8 l
Envase x 9.5 l
Envase x 19 l
Tanque x 200 l

REGISTRO NACIONAL: 39 - H 77/ NA

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.

INSTRUCCIONES DE USO DE ACCIÓN:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	PC
Bordes de áreas agrícolas	**Diente de león** (*Taraxacum officinale* Weber) **Pata de gallina** (*Poa anua* L.), **Kikuyo** (*Pennisetum clandestinum* Hochst.)	2.50 l/ha	No aplica

PC: Periodo de carencia.