BRONCHICINE® CAE

Reg. B-1196-103. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Bacterina para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina.

FÓRMULA

Cada dosis (1 ml) contiene a la liberación:

Extracto antigénico de *Bordetella bronchiseptica* ≥ 3X108 CFU, cepa 78-9159.	
Conservador: Timerosal	≤ 0.01%

DESCRIPCIÓN

BRONCHICINE® CAE es un extracto antigénico sin adyuvante obtenido a partir de células de *Bordetella bronchiseptica*, que se recomienda su uso como ayuda en la prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las perreras) causada por el microorganismo mencionado.

El efecto de persistencia de los anticuerpos maternos de *B. bronchiseptica*, sobre la respuesta inmune en los cachorros no ha sido determinado en esta bacterina.

Cachorros de madres inmunes al organismo usualmente manifiestan títulos bajos de anticuerpos que se disipan a las 4 o 6 semanas de edad.

Aunque la tos de las perreras se considera una enfermedad de etiología compleja puede ser producida mediante el desafío de *B. bronchiseptica*. El confinamiento y hacinamiento de los animales favorece la diseminación de la enfermedad.

La terapia antimicrobiana no ha demostrado ser exitosa en la reducción o eliminación de la *B. bronchiseptica* en perros.



INDICACIONES

Coadyuvante en la prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las perreras).

PRESENTACIÓN

Blíster con 50 viales de 1 dosis (1 ml)

INDICADO EN

PERROS

CACHORROS
A PARTIR DE 8 SEMANAS DE EDAD.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea exclusivamente

- 1 ml vía subcutánea a cachorros a partir de las 8 semanas de edad.
- Debe aplicarse una segunda dosis 2 a 4 semanas después.
- Se recomienda la revacunación anual.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Emplee el contenido en su totalidad una vez abierto el envase.
- Extreme precauciones para evitar la contaminación microbiana del producto.
- Como con muchas vacunas, puede ocurrir anafilaxis después de su uso. Se recomienda epinefrina como antídoto inicial y debe ser seguida de una terapia de soporte apropiada. Se deben usar jeringas y agujas esterilizadas para administrar este producto.
- Pueden llegar a presentarse casos raros de irritación local transitoria en el sitio de aplicación posterior al empleo de este producto.
- **Consulte al Médico Veterinario.**
- **Su venta requiere receta médica.**

ALMACENAMIENTO

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- La exposición prolongada a altas temperaturas puede afectar adversamente la potencia.
- No congelar.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Disponer de los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.

La imagen del producto es de referencia.

zoetis