

BRONKOXT

EXPECTORANTE MUCOLÍTICO
SOLUCIÓN ORAL
REG.SAN: 6E-12472-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Bromhexina	0.6 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRÁCTICA
CANINOS	2 mg/Kg	3,3 mL/10Kg/12h/7-10 días
FELINOS	1 mg/Kg	0,5 mL/3Kg/24h/7-10 días
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral		

INDICACIONES DE USO

BRONKOXT es un expectorante mucolítico de acción directa, la bromhexina estimula y facilita la expulsión de secreciones traqueobronquiales, disminuyendo su viscosidad y facilitando la eliminación.
Está indicado en el tratamiento de todas las afecciones del tracto respiratorio, de naturaleza infecciosa o no, agudas o crónicas que cursen con secreción o moco.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral

FARMACOCINÉTICA

Posterior a la administración por vía oral se absorbe a través del tracto gastrointestinal y la concentración máxima en plasma se alcanza al cabo de 1 hora. Experimenta una cinética de primer paso del 75-80% y la biodisponibilidad absoluta en las formas orales es del 20-25%. Su vida media de eliminación es de 6 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

La bromhexina es un fármaco sintético que, igual que su metabolito, el ambroxol, ejerce efecto mucolítico y expectorante. Reduce la viscosidad de las secreciones bronquiales y aumenta el volumen del esputo al inducir despolimerización hidrolítica de las mucoproteínas fibrilares. También estimula la actividad ciliar del epitelio.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

- Usar soluciones frescas, no guardar sobrantes.
- No administrar en pacientes con úlceras gástricas.



BRONKOXT

EXPECTORANTE MUCOLÍTICO
SOLUCIÓN ORAL
REG.SAN: 6E-12472-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Bromhexina	0.6 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRÁCTICA
CANINOS	2 mg/Kg	3,3 mL/10Kg/12h/7-10 días
FELINOS	1 mg/Kg	0,5 mL/3Kg/24h/7-10 días
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral		

- No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
- Produce elevación transitoria del aspartato aminotransferasa (AST).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No reportadas.

REACCIONES ADVERSAS

Son poco frecuentes, sin embargo, en pacientes sensibles se podrían presentar náuseas, vómito, gastritis, anorexia, diarrea, dolor epigástrico, vértigo y dolor de cabeza.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco x 50 ml