

CIPERJABÓN

ECTOPARASITICIDA
JABÓN
REG. SAN: 3B1-2-9795-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 70 g contiene:

Cipermetrina	1 g
Excipientes c.s.p.	70 g

ESPECIES

DOSIS

MODO DE EMPLEO

- Mojar completamente el pelo y la piel del animal.
- Aplicar el Jabón dando masaje vigoroso.
- Dejar actuar por 10 minutos.
- Enjuagar hasta remover toda la espuma.
- Repetir la operación y finalmente, enjuagar el animal hasta dejar la piel limpia.
- Como tratamiento inicial, bañar los animales semanalmente, controlado el problema, seguir la frecuencia normal del baño.

INDICACIONES DE USO

Jabón antiparasitario externo para el control de pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos. Útil como coadyuvante en el tratamiento de dermatitis y seborreas ocasionadas por parasitosis externas. Tiene acción desodorante y aromatizante.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica

FARMACOCINÉTICA

La cipermetrina es lipofílica. El metabolismo de los piretroides sintéticos es muy similar en todos los mamíferos, produciéndose una separación del enlace éster para formar ácido fenoxibenzóico y derivados del ácido ciclopropanocarboxilico, los cuales se excretan conjugados.

MECANISMO DE ACCIÓN

Es un ectoparasiticida de contacto del grupo de los piretroides tipo II, se caracteriza por contener un grupo alfa-ciano en su molécula. Los piretroides tipo II afectan principalmente a los canales de sodio en la membrana nerviosa del parásito, y ocasionan un incremento transitorio en la permeabilidad del sodio, durante la excitación. Mantienen la modificación de los canales de sodio de forma persistente, despolarizan la membrana y bloquean el potencial de acción sin causar actividad repetitiva presináptica. Otro posible mecanismo de acción de los piretroides tipo II incluye una acción sobre el complejo receptor del GABA.



CIPERJABÓN

ECTOPARASITICIDA
JABÓN
REG. SAN: 3B1-2-9795-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 70 g contiene:

Cipermetrina	1 g
Excipientes c.s.p.	70 g

ESPECIES

DOSIS

MODO DE EMPLEO

- Mojar completamente el pelo y la piel del animal.
- Aplicar el Jabón dando masaje vigoroso.
- Dejar actuar por 10 minutos.
- Enjuagar hasta remover toda la espuma.
- Repetir la operación y finalmente, enjuagar el animal hasta dejar la piel limpia.
- Como tratamiento inicial, bañar los animales semanalmente, controlado el problema, seguir la frecuencia normal del baño.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
No administrar a pacientes con hipersensibilidad al activo.
Mantener el producto alejado de los ojos del paciente.
Se sugiere que los propietarios o el médico laven sus manos después de la aplicación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Evitar la administración concurrente con otro ectoparasiticida tópico.

REACCIONES ADVERSAS

La hipersensibilidad y las reacciones irritativas locales son posibles. La posibilidad de irritación se incrementa a medida que aumenta la concentración de la clorhexidina; no se recomienda su uso durante un tiempo prolongado, en particular sobre tejido de granulación.

RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja x 70 g