LABORATORIOS
SERVINSUMOS

Diarrevet®

NTIDIARRÉICO BACTERIOSTÁTICO ORAL
Polvo soluble





LABORATORIOS
SERVINSUMOS



Sulfaguanidina, caolín, pectina, electrolitos. ANTIDIARRÉICO, con acción bacteriostática intestinal, protector de la mucosa intestinal, modulador del peristaltismo. Coadyuva al proceso de rehidratación. Indicado en terneros, potros, porcinos, borregos, caninos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 gramos contienen:

Sulfaguanidina	66 g
Caolin coloidal	25 g
Pectina cítrica rápida	2 g
Novatropina	0.03 g
Cloruro de sodio	0.36 g
Cloruro de potasio	0.28 g
Excipientes c.s.p.	100 g

INDICACIONES

Diarrevet es eficaz en diarreas causadas por E coli, Pasteurella sp, Streptococcus sp, Shigella sp, Proteus sp, y
Staphylococcus.

ADMINISTRACIÓN

Disolver en agua potable o leche y suministrar vía oral. Suministrar cada 12 horas durante 3 a 4 días consecutivos.

DOSIS

20 g (2 sobres) por cada 50 kilos de peso vivo. Como dosis inicial, continuar el tratamiento administrando 10 gramos (1 sobre por cada 50 kilogramos de peso, cada 12 horas durante 3 o 4 días consecutivos o de acuerdo al criterio del
médico veterinario.

PRECAUCIONES

Los trastornos gastrointestinales, a demás de nauseas y vomito, pueden observarse cuando las concentraciones de sulfonamida son suficientemente elevadas en el tracto como para trastornar el equilibrio normal de la microflora y la síntesis de vitamina B. Se deprime la función celulolitica de la microflora ruminal pero el efecto generalmente es pasajero. La Novatropina a pesar de su efecto terapéutico puede producir nerviosismo, excitación, boca seca, fotofobia
e incoordinación muscular.
A este animal se le puede inyectar barbitúricos para causar sedación o fisostigmina pro vía endovenosa a dosis-efecto, iniciando con 1 mg/kg de peso vía subcutánea.

LABORATORIOS
SERVINSUMOS

PRESENTACIONES

Sobre por 10 g en caja por 10 sobres y dispensador por 50 sobres.

ESPECIES



Reg ICA N° 2972 DB