

DICLOFENACO K

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL
SOLUCIÓN INYECTABLE
REG.SAN.8A4-8801-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Diclofenaco Potásico	5000 mg
Excipiente c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN		
Dosis recomendada: 2,5 mg / Kg de peso vivo.		
ESPECIE	**PESO (Kg)**	**DOSIS**
Equinos	50	2,5 mL
	100	5 mL
Bovinos	200	10 mL
	300	15 mL
Porcinos	400	20 mL
Ovinos	500	25 mL
Dosis recomendada: 1,0 mg / Kg de peso vivo.		
Caprinos	50	1 mL
	100	2 mL
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramuscular.		

INDICACIONES DE USO

DICLOFENACO K es un potente antiinflamatorio no esteroidal con acción analgésica, antipirética.
Equinos: Alivia el dolor asociado con trastornos músculo-esqueléticos, inflamaciones, cojera, dolor abdominal, visceral, cólico, fiebre, etc.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: Asociado con cualquier antibiótico. En caso de mastitis, dolores músculo-esqueléticos, fiebre, cólicos, traumatismos, inflamación por herida o cirugía, golpes, torceduras. En paresia post parto (vaca caída) quita el dolor y edema.
Porcinos: Síndrome de mastitis, metritis agalactia (MMA), con presencia de dolor, fiebre e inflamación en donde la antibioticoterapia no es suficiente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular

FARMACOCINÉTICA

En bovinos, administrado por vía intramuscular a una dosis de 2,5 mg de diclofenaco se absorbe de forma rápida, con una *Cmax* de 4,6 ug/ml a las 3,4 horas. La semivida de eliminación es de 11,3 h con una biodisponibilidad del 100%.

En cerdos a los que se les administro 2,5 mg/kg de Diclofenaco por vía intramuscular durante 6 días, se obtuvo una *Cmax* de 4,7 ug/ml a las 0,5h, con una semivida de eliminación estimada de 3,4 h.

En caballos, administrados por vía intramuscular, se obtiene una *Cmax* de 1,99 ug/ml al cabo de 1 hora, manteniéndose niveles en circulación durante 36-48 horas.



DICLOFENACO K

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL
SOLUCIÓN INYECTABLE
REG.SAN.8A4-8801-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Diclofenaco Potásico	5000 mg
Excipiente c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN		
Dosis recomendada: 2,5 mg / Kg de peso vivo.		
ESPECIE	**PESO (Kg)**	**DOSIS**
Equinos	50	2,5 mL
	100	5 mL
Bovinos	200	10 mL
	300	15 mL
Porcinos	400	20 mL
Ovinos	500	25 mL
Dosis recomendada: 1,0 mg / Kg de peso vivo.		
Caprinos	50	1 mL
	100	2 mL
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramuscular.		

El diclofenaco se une a las proteínas plasmáticas mediante una unión fuerte y caracterizada por un volumen aparente de distribución no particularmente elevado.
La alteración de la permeabilidad de las membranas producida por el proceso inflamatorio, facilita el paso del Diclofenaco al lugar foco de la inflamación.
Se metaboliza a nivel hepático y sigue un ciclo enterohepático. La excreción del Diclofenaco y sus metabolitos tiene lugar por vía renal y biliar.

MECANISMO DE ACCIÓN

El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) con actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética.
Actúa a nivel del metabolismo del ácido araquidónico mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, responsable de la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

- Administrar solo en las especies indicadas.
- No usar en animales que padezcan de trastornos gastrointestinales, como son lesiones ulcerativas, ya que el diclofenaco agravaría la sintomatología.

INTERACCIONES

- No administrar en conjunto con otros antiinflamatorios ya que aumenta el riesgo de aparición de reacciones adversas por lo que se recomienda no administrar simultáneamente con glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroides, ni con anticoagulantes.



DICLOFENACO K

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL
SOLUCIÓN INYECTABLE
REG.SAN.8A4-8801-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Diclofenaco Potásico	5000 mg
Excipiente c.s.p.	100 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN		
Dosis recomendada: 2,5 mg / Kg de peso vivo.		
ESPECIE	**PESO (Kg)**	**DOSIS**
Equinos	50	2,5 mL
	100	5 mL
Bovinos	200	10 mL
	300	15 mL
Porcinos	400	20 mL
Ovinos	500	25 mL
Dosis recomendada: 1,0 mg / Kg de peso vivo.		
Caprinos	50	1 mL
	100	2 mL
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramuscular.		

- Aminoglucósidos, glucocorticoides, AINE y otras sustancias con alto grado de unión a proteínas plasmáticas pueden competir por unirse a éstas y provocar efectos tóxicos. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente neurotóxicas.

REACCIONES ADVERSAS

Ninguna reportada

RETIRO

Carne: 10 días.
No utilizar en animales cuya leche se destine al consumo humano

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco de 10 ml
Frasco de 50 ml