FELOCELL® 3


Reg. B-1196-111. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Vacuna contra Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia Felina.

FÓRMULA

Cada dosis de 1 mL contiene:

Virus Vivos Modificados, envasados en forma liofilizada con gas inerte en lugar de vacío.	Cada dosis contiene un mínimo de: $10^{6.2\text{-}8.2}$ $TCID^{50}$ de FVR $10^{6.7\text{-}8.7}$ $TCID^{50}$ de FCV $10^{3.5\text{-}5.5}$ $TCID^{50}$ de FPV
Conservador: Gentamicina	1 mL



DESCRIPCIÓN

FELOCELL® 3 es para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la Rinotraqueitis Viral Felina (FVR) causada por el virus Herpes Felino - 1, la enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino (FCV) y la Panleucopenia Felina (FPL) causada por el Parvovirus Felino (FPV), Felocell® 3 contiene cepas atenuadas del virus de la Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia Felina (cepas de Leopardo Johnson Snow), propagados en líneas celulares establecidas.

INDICACIONES

Se recomienda la vacunación de gatos sanos. Rehidratar asépticamente la vacuna liofilizada con el diluente estéril que la acompaña. Agite bien y administre 1 ml intramuscular o subcutáneamente.

PRESENTACIÓN

Blíster con 25 dosis	
25 frascos de 1 dosis de vacuna, rehidratar cada una a 1 mL.	25 frascos de 1 mL de diluente estéril.

INDICADO EN

GATOS ADULTOS | CACHORROS

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea o Intramuscular

- **Primovacunación:** Los gatos sanos de 12 semanas de edad o más deben recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas. Si se vacunan antes de las 12 semanas de edad, se deberán revacunar cuando cumplan las 12 semanas de edad.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

La imagen del producto es de referencia.

zoetis

FELOCELL® 3

Reg. B-1196-111. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Vacuna contra Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia Felina.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Utilice el contenido completo una vez abierto el envase.
- Se deben emplear jeringas y agujas estériles para administrar esta vacuna. No esterilizar con químicos, porque trazas del desinfectante pueden inactivar a la vacuna.
- Contiene gentamicina como conservador.
- Se debe evitar la vacunación de gatas gestantes.
- Este producto ha demostrado ser eficaz en animales sanos. No es posible que se desarrolle una respuesta inmune protectiva si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, están mal nutridos o parasitados, están estresados debido a transporte o por condiciones ambientales, están inmunosuprimidos, o si la vacuna no es administrada de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.
- Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada.
- Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a 2°–8° C. La exposición a temperaturas superiores y/o los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.
- No congele.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Incinere los envases y todo el contenido no utilizado.

zoetis