ANTIPARASITARIO

CALIER

Calimec®

Endoparasiticida y ectoparasiticida, inyectable de amplio espectro, alta eficacia, y larga persistencia.

CALIER - All rights reserved



Composición

Cada 100 mL de solución contienen:
Doramectina 1 g.
Excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

En bovinos y ovinos para tratamiento y control de los nemátodos gastrointestinales, helmintos pulmonares, oculares, miasis, piojos, ácaros de la sarna y garrapatas. Nemátodos gastrointestinales (adultos y larvas en 4º estadío): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), O. *lyrata*, Haemonchus placei, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia spp., N. spathiger*, Bunostomun phlebotomum*, Strongyloides papillosus*, Oseophagostomum radiatum y Trichuris spp*, Chabertia ovina*, (*adultos), helmintos pulmonares (adultos y larvas en 4º estadío), *Dictyocaulus viviparus*, oculares (adultos): *Thelazia spp.* Miasis: *Hypoderma bovis, H. lineatum.* Piojos chupadores: H*aematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus; Oestrus ovis*; y ácaros de la sarna: *Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis* y como coadyuvante en el control de la garrapata:
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

Dosis:

1 mL de CALIMEC cada 50 Kg de peso vivo (200 mcg de Doramectina por Kg de peso vivo.
Para el uso contra garrapata del Bovino en zona infestada (sucia), zona de erradicación y zona indemne, repetir la aplicación cada 21 días.
Ovinos: 1 mL de CALIMEC cada 50 Kg de peso vivo.
En casos de sarna ovina el tratamiento se repetirá a los 7 días de la primera aplicación.

Vía de administración: Vía subcutánea

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a la doramectina.

* Las Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

* Disponga del material de envase acorde a la normatividad ambiental vigente.

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a una temperatura inferior a 30 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, o embalajes destinados a ellos.
USO VETERINARIO
venta bajo fórmula del médico veterinario

Tiempo de retiro:

Los bovinos y ovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 70 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano. No aplicar en hembras bovinas 60 días previos al parto.

Fabricado por:

Laboratorios Calier de Uruguay S.A.
Reg. ICA Núm. 10873 – MV.

Presentación:

Frascos plásticos de polipropileno por 50 mL, 200 mL, o 500 mL.

COPIA NO CONTROLADA

Control de Cambios		
Fecha de vigencia anterior	**Modificaciones**	**Persona que solicita la modificación**
N/A	N/A	N/A

Firmas			
Actividades	**Elaboración**	**Revisión**	**Aprobación**
Responsable	Fabián Magaña	Carlos Cortés	Julieth Bernal
Cargo	Analista Garantía de la Calidad	Jefe de Aseguramiento de la Calidad	Gerente de Regulatorios y Registro
Firma	F.MAGAÑA	C.CORTÉS	J.BERNAL
Fecha	2023-09-18	2023-09-18	2023-09-18

CALIER - All rights reserved

COPIA NO CONTROLADA