PLUSELAR 1,2

Dispositivo intravaginal impregnado con progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos



Forma farmacéutica

Dispositivo intravaginal

Composición

Cada dispositivo intravaginal contiene:
Progesterona (4-pregnano 3,20- diona) micronizada 1,2 g. Silicona Inerte c.s.p.1 dispositivo intravaginal

CALIER - All rights reserved

Indicaciones*

- Control del ciclo estral en novillas y vacas.
- Tratamiento del anestro posparto.
- Acortamiento del período parto concepción.

El producto se aplicará de acuerdo a los siguientes programas:

Protocolo recomendado

Indicación	Día 0	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10
Anestro	ID+BE2	PG		RD+eCG+PG	BE1	IA
Celo silente	ID+BE2		RD		IA	
Ovario quístico	ID		PG		RD	IA
Sincronización de celo	ID+BE2		RD+PG	BE1	IATF	

Referencias*

ID= Insertar dispositivo.
RD= Retirar dispositivo.
BE1= Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
BE2= Aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
eCG= Aplicar 400 a 500 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina.
PG= Aplicar 500 µg (2 ml) de d-cloprostenol (Veteglan).
En vaquillonas reducir la dosis en ambos casos.
IA= Inseminación artificial.
IATF= Inseminación artificial a tiempo fijo.

Resincronización de los retornos de celo al servicio o IA

Es posible realizar una resincronización a fin de detectar los animales que no hayan quedado preñados. A este fin se reinsertan los dispositivos el día 13 (día 0 = IA), se retiran el día 20 y se insemina a celo detectado los días 21 a 25. Los programas de uso pueden ser modificados de acuerdo al criterio del Médico Veterinario actuante.

Dosis recomendada para uso en vacas lecheras.

Vía de administración

Intravaginal.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.

No administrar en animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.

No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes del excipiente.

No utilizar en animales desnutridos. No utilizar en animales prepúberes.

No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

Tiempo de espera*

Leche: 0 días.
Carne: 0 días.

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

Aplicador Pluselar

Modo de uso

Paso 1: Coger el aplicador por su extremo libre e introducir el Pluselar.



Paso 2: Asegurarse que el Pluselar quede perfectamente calzado en el canal vaginal del aplicador con el extremo extractor sobresaliendo.



Paso 3: Coger el aplicador cargado e introducirlo en la vagina previamente higienizada. Una vez que llegue al fondo de la vagina presionar el émbolo para descargar el Pluselar y retirar luego el aplicador vacío.



Es recomendable realizar la desinfección de los aplicadores antes de su uso y entre animal y animal. A este fin se deben utilizar desinfectantes aprobados, especialmente aquellos en base a amonios cuaternarios.

Precauciones de uso y advertencias

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo. Lubricar el aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en novillas).

Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador luego de cada uso.

En animales de pobre condición corporal es posible no obtener el efecto esperado.

Producto de origen

Argentina

Presentación

Una bolsa conteniendo 10 dispositivos intravaginales.

PRODUCTO PARA EL USO DE LA REPRODUCCIÓN.
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CALIER - All rights reserved

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.