

IVERIND® 1% INYECTABLE

ENDECTOCIDA DE AMPLIO ESPECTRO (IVERMECTINA 1%)

Laboratorio India | Uso Pecuario

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio India

Clasificación Farmacológica: Endectocida inyectable a base de Ivermectina al 1% para el control integral de parásitos internos y externos.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para hatos ganaderos y porcícolas.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Ivermectina	1.0 g (1.0%)	Antiparasitario macrocíclico de eficacia comprobada frente a nematodos y ectoparásitos.
Vehículos y Excipientes c.s.p.	100 mL	Vehículo estéril de rápida absorción y alta tolerancia parenteral.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

ACCIÓN SISTÉMICA EFICAZ

Interfiere con el sistema nervioso de nematodos y artrópodos mediante la potenciación de la liberación de GABA, causando parálisis flácida y la eliminación natural del parásito.

CONTROL CLÍNICO CONFIABLE

Formulado bajo estrictos estándares farmacéuticos por Laboratorio India para asegurar pureza, potencia y consistencia en cada aplicación clínica de campo.

ESPECTRO DE ACCIÓN & INDICACIONES CLÍNICAS

- Bovinos:** Tratamiento de parásitos gastrointestinales (*Haemonchus*, *Ostertagia*, *Cooperia*), pulmonares (*Dictyocaulus*), sarna, piojos y control de garrapatas.
- Porcinos:** Control de nematodos gastrointestinales, parásitos renales (*Stephanurus dentatus*), piojos (*Haematopinus suis*) y ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*).

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & MEDICINA VETERINARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-IVERIND1-04
Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar mediante inyección subcutánea bajo prescripción del Médico Veterinario:

Especie Destino	Dosis Recomendada	Pautas de Aplicación
Bovinos	1 mL por cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg/kg)	Aplicar por vía subcutánea en la región floja del cuello o detrás de la paleta.
Porcinos	1 mL por cada 33 kg de peso vivo (equivalente a 300 mcg/kg)	Aplicar por vía subcutánea preferiblemente en la base de la oreja.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODOS DE RETIRO (CARNE)

- Bovinos:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después del último tratamiento.
- Porcinos:** El sacrificio debe realizarse al menos 28 días después de la última aplicación.
- No administrar en vacas lecheras en producción de leche para consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa a temperatura inferior a 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Recomendación Sanitaria

Utilice equipo de inyección limpio y estéril para cada aplicación. Respete rigurosamente los tiempos de resguardo en carne para garantizar la inocuidad alimentaria del hato.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Antiparasitarios, Insumos y Maquinaria Pecuaria

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Exención de Responsabilidad Comercial: Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación, incumplimiento de periodos de retiro o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.

