

IVERIND® LA 3.15%

ENDECTOCIDA INYECTABLE DE LARGA ACCIÓN (IVERMECTINA 3.15%)

Ivermectina 3.15% | Uso Bovino

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Especializado Pecuario

Clasificación Farmacológica: Endectocida inyectable de amplio espectro con vehículo tixotrópico de liberación sostenida (Long-Acting).

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para hatos ganaderos y clínicas.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Ivermectina	3.15 g (3.15%)	Antiparasitario macrocíclico de gran potencia y persistencia prolongada.
Vehículos y Excipientes Tixotrópicos	c.s.p. 100 mL	Vehículo de depósito que asegura absorción lenta y niveles plasmáticos sostenidos.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

ACCIÓN PROLONGADA (L.A.)

Su formulación avanzada garantiza una persistencia y protección prolongada en el organismo, controlando reinfestaciones parasitarias internas y externas por periodos superiores a 90 días.

BLOQUEO NEUROMUSCULAR

Intensifica la liberación de GABA (ácido gamma-aminobutírico), bloqueando la transmisión nerviosa en los parásitos e induciendo parálisis flácida y muerte de los mismos.

ESPECTRO DE ACCIÓN & INDICACIONES CLÍNICAS

- Parásitos Internos (Nematodos):** Control eficaz de formas adultas y larvarias de *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum* y gusanos pulmonares (*Dictyocaulus viviparus*).
- Parásitos Externos:** Tratamiento y control de garrapatas (*Rhipicephalus microplus*), piojos chupadores, ácaros de la sarna y miasis (nuche / tórsalo).

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & MEDICINA VETERINARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-IVERIND-03

Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar únicamente por vía subcutánea bajo supervisión del Médico Veterinario:

Especie Destino	Dosis Recomendada	Sitio de Aplicación y Recomendación
Bovinos	1 mL por cada 50 kg de peso vivo (equiv. a 630 mcg/kg)	Aplicar por vía subcutánea debajo de la piel floja en la región del cuello o detrás de la paleta. Agitar bien antes de usar.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODO DE RETIRO (CARNE Y LECHE)

- Bovinos (Carne):** Los animales tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta 122 días después del último tratamiento.
- Bovinos (Leche):** No administrar en vacas en lactancia ni en gestación avanzada cuya leche se destine al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa (temperatura menor a 30°C).
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Recomendación Sanitaria

Debido a su concentración de larga acción (3.15%), es fundamental dosificar estrictamente según el peso vivo estimado para evitar subdosificaciones y garantizar la máxima eficacia de control parasitario en pastoreo.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Antiparasitarios, Insumos y Maquinaria Pecuaria

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Exención de Responsabilidad Comercial: Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no asume responsabilidad legal por el uso inadecuado, sobredosificación, incumplimiento de periodos de retiro o aplicación incorrecta realizada por el usuario o profesional.

