MASTI LAC JERINGA INTRAMAMARIA

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO PARA VACAS EN LACTACIÓN

Laboratorio Llaguno | Inyector Intramamario

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Suspensión antibiótica intramamaria formulada específicamente para el tratamiento eficaz de la mastitis clínica y subclínica en vacas durante el periodo de lactación.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para hatos lecheros.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición activa por inyector:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Antibióticos de Acción Rápida (Sinergismo Activo)	Eliminación selectiva de bacterias gram-positivas y gram-negativas causantes de inflamación y caída en la producción lechera.
Excipientes Acuosos / Dispersantes c.s.p.	Vehículo de rápida difusión en la cisterna de la glándula mamaria sin irritar los tejidos.

MECANISMO DE ACTION & BENEFICIOS SANITARIOS

ACCIÓN TERAPÉUTICA INMEDIATA

Actúa de forma directa en el cuarto afectado durante la lactancia, combatiendo el foco infeccioso y reduciendo rápidamente los grumos, la inflamación y el dolor.

RECUPERACIÓN DE CALIDAD DE LECHE

Restaura los parámetros de recuento de células somáticas (RCS) y normaliza las características organolépticas de la leche en el menor tiempo posible.

INDICACIONES & ESPECIE DE DESTINO

- **Especie de Destino:** Bovinos (Vacas lecheras en plena lactancia).
- **Indicaciones Principales:** Tratamiento curativo de mastitis clínicas y subclínicas agudas o crónicas causadas por microorganismos sensibles a la formulación.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SANIDAD PECUARIA & SALUD DE LA UBRE

FICHA TÉCNICA OFICIAL
Ref: FT-VET-MASTILAC-02
Página 2 | Dosificación y Seguridad

MODO DE ADMINISTRACIÓN & POSOLOGÍA

Aplicación intramamaria exclusiva tras el ordeño:

Vía de Aplicación	Procedimiento Técnico Recomendado
Infusión Intramamaria (Por Cuarto)	Ordeñar completamente el cuarto afectado. Limpiar y desinfectar minuciosamente la punta del pezón con alcohol. Retirar el protector de la cánula, introducir en el canal del pezón e infundir todo el contenido de 1 jeringa (10 g) por cuarto afectado.
Frecuencia y Ciclo	Aplicar cada 12 o 24 horas durante 3 días consecutivos o según criterio del Médico Veterinario tratante.

PERÍODO DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODO DE RESGUARDO

- **Leche:** No destinar la leche de los animales tratados para consumo humano ni industrial hasta transcurrido el tiempo de retiro indicado por el fabricante tras la última aplicación.
- **Carne:** Respetar el tiempo de retiro antes del sacrificio para consumo.

ALMACENAMIENTO

- Conservar el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a temperatura inferior a 30°C.

Recomendación Sanitaria
Detectar y tratar la mastitis a tiempo con Masti Lac durante la lactancia previene daños permanentes en el tejido secretor y protege la rentabilidad de su producción lechera.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios, Sanidad e Higiene de Ubre
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Términos y Comercialización: *Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización y venta minorista/mayorista de insumos agropecuarios y veterinarios. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Laboratorio Llaguno) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, dosificación incorrecta o aplicación fuera de la prescripción del Médico Veterinario en campo.*