MASTI SEC JERINGA INTRAMAMARIA

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO PARA EL PERÍODO DE SECADO

Laboratorio Llaguno | Inyector Intramamario

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Suspensión antibiótica intramamaria de acción prolongada formulada para la prevención y tratamiento de mastitis en vacas durante el periodo de secado.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para hatos lecheros.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición activa por inyector:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Antibiótico de Amplio Espectro (Combinación sinérgica)	Eficaz contra gérmenes gram-positivos y gram-negativos causantes de mastitis subclínica y clínica en el secado.
Excipientes de Larga Retención c.s.p.	Vehículo oleoso especial que asegura una liberación sostenida del principio activo durante todo el periodo crítico.

MECANISMO DE ACCIÓN & BENEFICIOS SANITARIOS

PROTECCIÓN PROLONGADA EN SECADO

Actúa de manera sostenida en el tejido mamario durante la etapa de reposo, eliminando infecciones preexistentes y previniendo la colonización de nuevas bacterias.

PREPARACIÓN PARA LA LACTANCIA

Garantiza una ubre sana y limpia para el próximo parto, optimizando la producción de leche y reduciendo las tasas de descartes por mastitis clínica.

INDICACIONES & ESPECIE DE DESTINO

- **Especie de Destino:** Bovinos (Vacas lecheras al inicio del período de secado).
- **Indicaciones Principales:** Tratamiento profiláctico y curativo de mastitis en vacas fuera del período de ordeño, actúando frente a patógenos sensibles a la fórmula.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SANIDAD PECUARIA & SALUD DE LA UBRE

FICHA TÉCNICA OFICIAL
Ref: FT-VET-MASTISEC-01
Página 2 | Dosificación y Seguridad

MODO DE ADMINISTRACIÓN & POSOLOGÍA

Aplicación intramamaria exclusiva al finalizar la última ordeña:

Vía de Aplicación	Procedimiento Técnico Recomendado
Infusión Intramamaria (Por Cuarto)	Ordeñar a fondo la vaca. Limpiar y desinfectar rigurosamente el pezón con alcohol. Introducir la cánula de la jeringa e infundir el contenido completo (1 inyector de 10 g) en cada cuarto mamario afectado o en los cuatro cuartos al iniciar el secado.
Masaje Mamario	Masajear suavemente el pezón y la ubre hacia arriba tras la aplicación para facilitar la correcta difusión del producto.

PERÍODO DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODO DE RESGUARDO

- **Carne:** Respetar el tiempo establecido por el fabricante antes del sacrificio del animal para consumo.
- **Leche:** No utilizar en vacas en lactación activa. Respetar el tiempo de retiro en leche tras el parto según indicaciones del producto.

ALMACENAMIENTO

- Conservar el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a temperatura inferior a 30°C.

Recomendación Sanitaria
El período de secado es la ventana crítica más importante del ciclo productivo lechero. Un sellado y tratamiento adecuado con Masti Sec previene pérdidas económicas severas por mastitis en la siguiente lactancia.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios, Sanidad e Higiene de Ubre
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Términos y Comercialización: *Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización y venta minorista/mayorista de insumos agropecuarios y veterinarios. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Laboratorio Llaguno) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, dosificación incorrecta o aplicación fuera de la prescripción del Médico Veterinario en campo.*