Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DISTRIBUCIÓN VETERINARIA & SANIDAD PECUARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-NEXTP-02

Edición Comercial | 2 Páginas

NEXT PLATINO®

ENDECTOCIDA INYECTABLE DE LARGA ACCIÓN (3.15%)

Ivermectina 3.15% | Uso Bovino

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: MK (Tecnoquímicas S.A.)

Clasificación Farmacológica: Endectoparasiticida inyectable de larga acción y amplio espectro a base de Ivermectina al 3.15% en vehículo tixotrópico de liberación sostenida.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para explotaciones ganaderas y clínicas.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 100 mL de solución inyectable de larga acción contienen:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Ivermectina	3.15 g (3.15%)	Antiparasitario macrocíclico de alta potencia y liberación prolongada.
Vehículos y Excipientes Tixotrópicos	c.s.p. 100 mL	Vehículo especial de depósito y liberación sostenida (Long-Acting).

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

ACCIÓN PROLONGADA (L.A.)

Formulación avanzada que asegura una liberación sostenida del principio activo, manteniendo niveles terapéuticos plasmáticos por periodos prolongados frente a reinfestaciones en campo.

BLOQUEO NEUROMUSCULAR

Estimula la liberación de GABA e interfiere con los canales de cloro regulados por glutamato, induciendo parálisis flácida e hiperpolarización en las células nerviosas del parásito.

ESPECTRO DE ACCIÓN & INDICACIONES CLÍNICAS

- **Nematodos Gastrointestinales:** Control de formas adultas y larvarias de *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus* y *Oesophagostomum*.
- **Parasitosis Pulmonar:** Eficaz prevención y tratamiento de *Dictyocaulus viviparus*.
- **Ectoparásitos:** Control de miasis cutánea (nuche/tórsalo), piojos chupadores, ácaros de la sarna y coadyuvante en el control de garrapatas (*Rhipicephalus microplus*).

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & SANIDAD ANIMAL

FICHA TÉCNICA OFICIAL
Ref: FT-VET-NEXTP-02
Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar únicamente por vía subcutánea bajo la prescripción y supervisión del Médico Veterinario:

Especie Destino	Dosis Recomendada	Pautas de Aplicación y Sitio
Bovinos	1 mL por cada 50 kg de peso vivo (0.63 mg/kg)	Aplicar por vía subcutánea delante o detrás de la paleta en zona de piel floja.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

TIEMPOS DE RETIRO (CARNE Y LECHE)

- **Bovinos (Carne):** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después del último tratamiento.
- **Bovinos (Leche):** No administrar en vacas en lactancia cuya leche se destine al consumo humano directo o procesamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar a temperatura inferior a 30°C en un lugar fresco y seco.
- Proteger el envase de la radiación solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Recomendación Sanitaria
Debido a su alta concentración y efecto de larga acción, se recomienda dosificar con precisión según el peso vivo del animal para optimizar el rendimiento técnico y respetar los periodos de resguardo sanitario.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Antiparasitarios, Medicamentos e Insumos Pecuarios
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y envíos directos

Exención de Responsabilidad Comercial: *Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por MK / Tecnoquímicas S.A.) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación, incumplimiento de tiempos de retiro o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.*