

TIGANIL® 450 ORAL

ANTIBIÓTICO POLVO SOLUBLE A BASE DE TIAMULINA FUMARATO

Tiamulina 56.25%

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Veterquímica S.A.

Clasificación Farmacológica: Antibacteriano antimicoplásmico oral de amplio espectro, indicado para porcinos y aves.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para granjas y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 100 g de polvo soluble contienen:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Tiamulina Fumarato Hidrógeno	56.25 g (Equiv. a 45 g de Tiamulina base)	Antibiótico diterpénico activo frente a micoplasmas y bacterias grampositivas.
Excipientes c.s.p.	100 g	Vehículo soluble de alta estabilidad para agua de bebida o alimento.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

INHIBICIÓN PROTEICA

Actúa uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la síntesis de proteínas esenciales para el desarrollo y multiplicación del microorganismo patógeno.

ALTA DIFUSIÓN TISULAR

Posee excelente absorción oral y rápida penetración en tejidos respiratorios e intestinales, siendo altamente eficaz en el control de afecciones complejas.

ESPECTRO DE ACCIÓN & INDICACIONES CLÍNICAS

- Cerdos:** Tratamiento y prevención de Neumonía enzoótica porcina, Disentería porcina (*Brachyspira hyodysenteriae*), Ileitis (*Lawsonia intracellularis*) y Síndrome Respiratorio Porcino.
- Aves (Pollos y Ponedoras):** Control de Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC) y micoplasmosis aviar causada por *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & MEDICINA VETERINARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-TIGANIL-01
Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrado a través del agua de bebida o mezclado en el alimento según criterio veterinario:

Especie Destino	Dosis Recomendada	Duración y Pautas de Tratamiento
Cerdos	0.05% a 0.1% en agua de bebida (o según mg/kg de peso vivo)	De 3 a 5 días consecutivos según la patología a tratar.
Aves (Pollos / Ponedoras)	0.025% a 0.05% en el agua de bebida	Durante 3 a 5 días continuos asegurando consumo de agua medicada.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODO DE RETIRO (CARNE)

- Cerdos:** Retirar el tratamiento al menos 5 días antes del sacrificio de los animales para consumo humano.
- Aves:** Retirar el tratamiento al menos 5 días antes del beneficio. No administrar en aves en postura cuya producción de huevo se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES DE COMPATIBILIDAD

- Advertencia:** No administrar productos que contengan poliéter ionóforos (como monensina, narasina o salinomycin) durante o al menos 7 días antes y después del tratamiento con tiamulina por riesgo de toxicidad severa.

Recomendación Sanitaria

Prepare soluciones de agua medicada diariamente y asegúrese de que los animales consuman la totalidad del líquido provisto. Almacene el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Antibióticos, Antiparasitarios e Insumos Pecuarios

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos nacionales

Exención de Responsabilidad Comercial: Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Veterquímica S.A.) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación, interacción con ionóforos, incumplimiento de tiempos de retiro o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.

