

TORIL ECTOPARASITICIDA

GARRAPATICIDA, SARNICIDA Y PIOJICIDA CONCENTRADO DE USO EXTERNO

Laboratorio Llaguno | Concentrado Emulsionable

DATOS DEL LABORATORIO & CLASIFICACIÓN

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Ectoparasitida de contacto y acción prolongada para baños de aspersión o inmersión en ganadería.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA (COMPONENTE ACTIVO)

Formulación farmacéutica concentrada por cada 100 mL:

Componente Activo	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Amitraz	24.0 g (Equiv. al 24%)	Ectoparasitida amidínico que actúa sobre el sistema nervioso central del parásito, induciendo desprendimiento y muerte.
Excipientes & Emulsificantes c.s.p.	100 mL	Vehículo orgánico especializado para emulsión acuosa estable en baños externos.

MECANISMO DE ACCIÓN & BENEFICIOS SANITARIOS

ACCIÓN NEUROTÓXICA EN ECTOPARÁSITOS

Interfiere con los receptores de octopamina en el sistema nervioso de garrapatas y ácaros, provocando la interrupción de la alimentación, letargo, desprendimiento y eliminación total.

EFFECTO RESIDUAL PROLONGADO

Garantiza protección contra la reinfestación por semanas, controlando incluso cepas de garrapatas resistentes a organofosforados y piretroides convencionales.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SANIDAD PECUARIA & ECTOPARASITICIDAS EXTERNOS

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-VET-TORIL-01

Página 2 | Dosificación y Seguridad

ESPECIES DE DESTINO & INDICACIONES CLÍNICAS

- Especies de Destino:** Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. (Nota: No aplicar directamente en gatos o equinos).
- Indicaciones Principales:** Control y erradicación de garrapatas (*Rhipicephalus microplus*, *Amblyomma*), ácaros de la sarna (*Sarcoptes*, *Psoroptes*) y piojos chupadores (*Haematopinus*).

MODO DE APLICACIÓN, DILUCIÓN & POSOLOGÍA

Instrucciones técnicas para baños de aspersión externa:

Método de Baño	Dilución Recomendada	Observación Técnica
Aspersión (Mochila o Bomba)	1 mL de Toril por cada 1 Litro de agua (ej: 20 mL en bomba de 20L)	Rinde para bañar de 4 a 5 animales adultos cubriendo todo el cuerpo a contrapelo.
Inmersión / Bañera	Según volumen del tanque (carga inicial y recarga según protocolo)	Ideal para hatos numerosos. Asegurar mezcla homogénea antes de introducir el ganado.

PERÍODO DE RETIRO, PRECAUCIONES & ALMACENAMIENTO

PERÍODO DE RESGUARDO

- Carne:** 14 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- Leche:** 48 horas (2 días) tras el último tratamiento.

PRECAUCIONES DE USO

- Utilice equipo de protección (guantes, mascarilla). No fumar ni comer durante la aplicación. Producto tóxico para peces y abejas.
- Conservar en envase original bajo 30°C.

Recomendación Sanitaria de Agro Campos

El baño periódico con Toril Ectoparasitica interrumpe el ciclo biológico de las garrapatas en los potreros y protege la salud cutánea de su hato.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Ectoparasitidas

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Términos y Comercialización: Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización y venta minorista/mayorista de insumos agropecuarios y veterinarios. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Laboratorio Llaguno) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, dosificación incorrecta o aplicación fuera de la prescripción del Médico Veterinario en campo.

