

TREOXIN® INYECTABLE

ANTIMICROBIANO DE ÚLTIMA GENERACIÓN A BASE DE TULATROMICINA 10%

Tulatromicina 10% | Dosis Única

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Farmabase Saúde Animal

Clasificación Farmacológica: Macrólido semisintético de larga acción para el control de enfermedades respiratorias bovinas y porcinas.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para granjas y explotaciones ganaderas.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Tulatromicina	10.0 g (10%)	Macrólido de acción prolongada y alta afinidad por el tejido pulmonar.
Vehículos y Excipientes c.s.p.	100 mL	Solución estéril optimizada para administración parenteral eficaz.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

ALTA CONCENTRACIÓN PULMONAR

Se concentra rápidamente en los leucocitos polimorfonucleares y macrófagos alveolares, dirigiéndose de forma directa al foco de infección en las vías respiratorias.

PROTECCIÓN PROLONGADA (DOSIS ÚNICA)

Proporciona un efecto terapéutico sostenido de hasta 14 a 18 días en el organismo, reduciendo el estrés por manipulación en el corral.

ESPECTRO DE ACCIÓN & INDICACIONES CLÍNICAS

- Bovinos:** Tratamiento y metafilaxia de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB) asociada a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Histophilus somni*.
- Porcinos:** Tratamiento y control del Complejo Respiratorio Porcino asociado a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & MEDICINA VETERINARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-TREOXIN-01
Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración parenteral en dosis única según la especie:

Especie Destino	Dosis Recomendada	Vía de Aplicación y Pautas
Bovinos	1 mL por cada 40 kg de peso vivo (equivalente a 2.5 mg/kg)	Vía subcutánea (SC) en una sola aplicación en la región del cuello.
Porcinos	1 mL por cada 40 kg de peso vivo (equivalente a 2.5 mg/kg)	Vía intramuscular (IM) en la región del cuello, dosis única.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODOS DE RETIRO (CARNE Y LECHE)

- Bovinos (Carne):** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 18 días posteriores al tratamiento.
- Porcinos (Carne):** El sacrificio de cerdos debe esperarse al menos 5 días tras la aplicación.
- No usar en vacas nodrizas cuya leche se destine al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente inferior a 30°C.
- Proteger de la luz solar directa y mantener el frasco en su estuche original.

Recomendación Sanitaria

Para animales con un peso superior a 300 kg, se recomienda dividir la dosis total en dos sitios de aplicación diferentes para maximizar la absorción y confort del animal.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Antibióticos, Antiparasitarios e Insumos Pecuarios

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos nacionales

Exención de Responsabilidad Comercial: Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Farmabase) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación, incumplimiento de tiempos de retiro o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.

