CALIMAST LACTACIÓN

Antibiótico y antiinflamatorio intramamario para manejo de mastitis

California | Intramamaria

DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante: Laboratorio California.

Clasificación Técnica: Antimicrobiano y antiinflamatorio intramamario para vacas en lactancia, con cloxacilina, ampicilina y betametasona.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición por jeringa de 10 ml:

Componente	Función Principal
Cloxacilina sódica (200 mg)	Antibiótico betalactámico frente a bacterias sensibles, incluyendo estafilococos y estreptococos.
Ampicilina sódica (75 mg)	Antibiótico betalactámico que amplía la cobertura frente a microorganismos sensibles.
Betametasona sódica (4 mg)	Corticoide con acción antiinflamatoria local.
Excipientes c.s.p. 10 ml	Vehículo en cantidad suficiente para completar el contenido de una jeringa intramamaria.

FUNCIONAMIENTO Y BENEFICIOS

La cloxacilina y la ampicilina inhiben la síntesis de la pared bacteriana de microorganismos sensibles. La betametasona aporta acción antiinflamatoria local. Esta asociación permite abordar el componente infeccioso y la inflamación mamaria durante la lactancia, dentro de un programa veterinario de diagnóstico, tratamiento e higiene del ordeño.

APLICACIONES

- Tratamiento y control de mastitis durante la lactancia en vacas lecheras.
- Mastitis causada por Staphylococcus aureus sensible a la formulación.
- Infecciones por Streptococcus agalactiae, S. uberis y S. dysgalactiae sensibles.
- Infecciones por Trueperella pyogenes y Escherichia coli sensibles, bajo criterio veterinario.

MODO DE USO

Aplicación	Instrucciones de Uso
Intramamaria, en lactancia.	Tras ordeñar y desinfectar el pezón, aplicar una jeringa por cuarto afectado y masajear suavemente. Repetir diariamente o después de cada ordeño, de 2 a 4 aplicaciones según gravedad y criterio del médico veterinario.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO

Precauciones
Uso veterinario. Mantener asepsia y registrar las vacas y cuartos tratados. No exceder la pauta prescrita ni usar la jeringa en varios cuartos.

Restricciones de uso
Excluir la leche del consumo durante el tratamiento y cumplir el retiro indicado para leche y carne por la etiqueta y el médico veterinario.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes y limpiar y desinfectar los pezones antes de aplicar.
- Mantener la jeringa sin contaminación y seguir la técnica intramamaria. Separar e identificar la leche de vacas tratadas durante el retiro.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y protegido de la luz, conforme a etiqueta. Mantener fuera del alcance de niños y comprobar integridad del envase.

Recomendaciones de Uso

Integrar Calimast Lactación a un programa de salud mamaria con diagnóstico, higiene del ordeño y seguimiento de la respuesta al tratamiento. Registrar las aplicaciones y cumplir los tiempos de retiro antes de destinar leche o carne a consumo.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.