

CERENIA®

Maropitant

Reg. Q-1196-702. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Antiemético para perros y gatos.


FÓRMULA

Cada ml contiene:

Maropitant (como citrato de maropitant)	10 mg
Vehículo c.b.p. / c.s.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN

El maropitant es un potente y selectivo receptor antagonista de la neurocinina (NK_1), que bloquea la acción farmacológica de la sustancia P en el sistema nervioso central (SNC). Maropitant es la designación no registrada para un sustituto de quinuclidina. La estructura química del Citrato de Maropitant es:



PRESENTACIÓN

Frascos de vidrio ámbar de 20 ml.

INDICADO EN

 PERROS	 CACHORROS A PARTIR DE 8 SEMANAS DE EDAD.
 GATOS	 CACHORROS A PARTIR DE 16 SEMANAS DE EDAD.

INDICACIONES

PERROS: Para el tratamiento sintomático del vómito agudo (por ej. Infección por parvovirus, gastroenteritis y pancreatitis) y la prevención del vómito asociado con el uso de un medicamento emético (por ej. quimioterapia, anestesia). **GATOS:** Para el tratamiento sintomático del vómito agudo.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intravenosa

Para el tratamiento sintomático del vómito agudo en perros:

- Perros de 2 a 4 meses de edad:** administrar CERENIA® por vía subcutánea, a una dosis de 1 mg/kg equivalente a 1 ml/10 kg de peso corporal una vez al día hasta por 5 días consecutivos.
- Perros de 4 meses de edad y mayores:** administrar CERENIA® por vía intravenosa, durante 1 a 2 minutos, o por vía subcutánea a una dosis de 1 mg/kg equivalente a 1 ml/10 kg de peso corporal, una vez al día hasta por 5 días consecutivos.

Para la prevención del vómito asociado con el uso de un medicamento emético en perros de 4 meses de edad y mayores:

- Administrar CERENIA® por vía intravenosa durante 1 a 2 minutos o por vía subcutánea a una dosis única de 1 mg/kg equivalente a 1 ml/10 kg de peso corporal, 45 minutos antes de administrar un medicamento pre-anestésico, o 60 minutos antes de la quimioterapia.

Para el tratamiento sintomático del vómito agudo en gatos de 4 meses de edad y mayores:

- Administrar CERENIA® por vía intravenosa durante 1 a 2 minutos o por vía subcutánea a una dosis de 1 mg/kg equivalente a 1 ml/10 kg de peso corporal una vez al día hasta por 5 días consecutivos.

CONTRAINDICACIONES

La inyección de CERENIA® está contraindicada en perros y gatos cuando hay sospecha de obstrucción gastrointestinal o ingestión de toxinas. El tratamiento inmediato se debe dirigir a resolver la causa subyacente y no el signo del vómito.

CERENIA®

Maropitant

Reg. Q-1196-702. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Antiemético para perros y gatos.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- No se utilice en humanos.
- La seguridad de CERENIA® no ha sido evaluada en perros o gatos usados para reproducción, o en perras y gatas gestantes o lactantes.
- La emesis puede estar asociada con estados graves, severamente debilitantes, por lo que se deben realizar evaluaciones de diagnóstico adecuadas. La hipovolemia combinada con el maropitant puede incrementar el riesgo de hipotensión; todos los perros y gatos con emesis constante deben recibir terapia de hidratación.
- CERENIA® inyectable debe ser usado con precaución en perros y gatos con bradicardia o enfermedad cardíaca subyacente, ya que el maropitant puede incrementar el riesgo de arritmias.
- Se puede presentar hipotensión leve y transitoria poco después de la administración IV en perros.
- El maropitant se metaboliza en el hígado, por lo tanto, se debe usar con precaución en perros y gatos con enfermedad hepática.
- El maropitant es un fármaco que se une fuertemente a las proteínas; usar con precaución con otros medicamentos que se ligan altamente a proteínas. La interacción de fármacos entre maropitant inyectable y otros fármacos no ha sido investigada a fondo en perros y gatos. Los perros y gatos hipoproteinémicos bajo tratamiento con maropitant deben ser monitoreados cercanamente; si se observan efectos adversos, se debe discontinuar el tratamiento.
- Si el tratamiento con maropitant no ha sido efectivo después de 3 días de uso, se debe usar un tratamiento alternativo para el control del vómito.
- No se ha valorado el uso concurrente de maropitant con otros agentes antieméticos en perros y gatos.
- Se debe monitorear de cerca el consumo de alimentos y ganancia de peso en cachorros tratados con CERENIA®. Se puede presentar anorexia y pérdida de peso. CERENIA® causa disminuciones del apetito y el peso corporal relacionadas con la dosis. En cachorros menores de 11 semanas de edad, se observó evidencia histológica de hipoplasia de la médula ósea con mayor frecuencia y mayor gravedad en cachorros tratados con CERENIA®, comparado con los cachorros de control. En cachorros de 16 semanas y mayores, no se observó hipoplasia de la médula ósea.

- En caso de inyección accidental o exposición, buscar ayuda médica. En algunos individuos, la exposición tópica puede provocar reacciones alérgicas localizadas en la piel. La exposición repetida o prolongada puede provocar sensibilidad en la piel. En caso de exposición accidental en la piel, lavar con agua y jabón. CERENIA® es también un irritante ocular. En caso de exposición ocular accidental, lavar con agua por 15 minutos y buscar ayuda médica.

- **Su venta requiere receta médica.**

- **Consulte al Médico Veterinario.**

ALMACENAMIENTO

- Debe ser almacenado a temperatura ambiente controlada de 20 a 25° C (68 a 77° F) con excursiones entre 15 a 30° C (59 a 86° F). Después de la primera punción, CERENIA® Solución Inyectable debe ser almacenado a temperatura de refrigeración de 2 a 8° C (36 a 46° F).
- Usar dentro de los 90 días posteriores a la primera punción del vial.
- Disponer de los envases vacíos, de acuerdo con las regulaciones locales vigentes. Co-procesar los envases y todo el contenido no utilizado.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- La tapa debe ser puncionada un máximo de 25 veces.