ANTIBIÓTICOS

CONVENIA®

Cefovecin Sódico

Reg. Q-1196-110. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Antimicrobiano de amplio espectro y larga acción para perros y gatos.

FÓRMULA


Cada ml contiene:

Cefovecin sódico equivalente a 80 mg de cefovecin	
Vehículo c.b.p. / c.s.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN

Cefovecin es un agente antimicrobiano semi-sintético de amplio espectro que pertenece a los agentes quimioterapéuticos de la familia de las cefalosporinas. Cefovecin es la designación general (no registrada) de la sal monosódica del ácido carboxílico (6R, 7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-tiazolil)(metoxiimino)acetil] amino]-8-oxo-3-[(2S)-terahidro-2-furanil]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2.

La estructura química del Cefovecin Sódico es:





PRESENTACIÓN

Caja con 1 frasco	
800 mg de Cefovecin/10 ml	320 mg de Cefovecin/4 ml

INDICADO EN

- **PERROS** ADULTOS
- **CACHORROS** A PARTIR DE 16 SEMANAS DE EDAD.
- **GATOS** ADULTOS
- **CACHORROS** A PARTIR DE 16 SEMANAS DE EDAD.

INDICACIONES

PERROS

CONVENIA® (Cefovecin) está indicado para el tratamiento de las infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo pioderma superficial secundario, heridas infectadas y abscesos), en perros, causadas por cepas susceptibles de *Staphylococcus intermedius, Streptococcus canis* (Grupo G), y *Escherichia coli* y/o *Pasteurella multocida.* También está indicado para el tratamiento de infecciones del tracto urinario (cistitis) causadas por cepas susceptibles de *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*, así como para el tratamiento de infecciones periodontales en perros, causadas por cepas susceptibles de *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

GATOS

CONVENIA® (Cefovecin) está indicado para el tratamiento de infecciones de la piel (heridas y abscesos), causadas por cepas susceptibles de *Pasteurella multocida*. Para el tratamiento de las infecciones de tejidos blandos (heridas y abscesos), así como para el tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas a *Escherichia coli*.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- Se recomienda obtener una muestra para cultivo y pruebas de sensibilidad (cultivo y antibiograma), antes de comenzar la terapia antimicrobiana.
- CONVENIA® se debe administrar por vía subcutánea a 8 mg/kg de peso corporal en gatos y perros.
- Para infecciones cutáneas y tejidos blandos, en perros se puede administrar una segunda aplicación subcutánea de 8 mg/Kg 14 días después de la primera aplicación. Se recomienda obtener una muestra para cultivo y pruebas de sensibilidad (cultivo y antibiograma), antes de comenzar la terapia antimicrobiana. La terapia con CONVENIA® se puede iniciar antes de conocer los resultados de estas pruebas. Si no se observa una respuesta aceptable al tratamiento en 3 o 4 días, se deberá reevaluar el diagnóstico y considerar una terapia alternativa apropiada.

La imagen del producto es de referencia.

zoetis

CONVENIA®

Cefovecin Sódico

Reg. Q-1196-110. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Antimicrobiano de amplio espectro y larga acción para perros y gatos.

- **Preparación de la solución inyectable:** Reconstruir asépticamente CONVENIA® con 4 ml (concentración final de 320 mg de cefovecin) o 10 ml (concentración final de 800 mg de cefovecin) de agua estéril inyectable. Agitar y dejar reposar el frasco hasta que se disuelva todo el material. La solución resultante contiene cefovecin sódico equivalente a 80 mg/ml de cefovecin. CONVENIA® es sensible a la luz y a la temperatura. Antes y después de la reconstitución el frasco se debe guardar en refrigeración en su caja original.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

PESO DEL ANIMAL (perros o gatos)	VOLUMEN DE CONVENIA® SC (8mg/Kg o 0.01 ml/Kg)
1.0 Kg	0.10 ml
2.5 Kg	0.25 ml
5.0 Kg	0.50 ml
10.0 Kg	1.00 ml
20.0 Kg	2.00 ml
30.0 Kg	3.00 ml
40.0 Kg	4.00 ml
50.0 Kg	5.00 ml

CONTRAINDICACIONES

- CONVENIA® está contraindicado en perros y gatos que se sepa tengan alergia al Cefovecin o a los antimicrobianos del grupo β-lactámicos (penicilinas y cefalosporinas).
- En caso de presentarse una reacción alérgica o anafilaxis, no se deberá volver de administrar CONVENIA® y se deberá de establecer una terapia apropiada.
- La anafilaxia puede requerir de tratamiento con epinefrina y otras medidas de emergencia, incluyendo oxigenación, administración de fluidos intravenosos, antihistamínicos intravenosos, corticosteroides y el manejo de vías respiratorias, según esté clínicamente indicado.

PRECAUCIONES

- La prescripción de medicamentos antibacterianos en ausencia de una infección bacteriana demostrada o de la que hay amplia sospecha, tiene pocas posibilidades de ofrecer beneficios a los animales tratados y puede incrementar el riesgo del desarrollo de patógenos resistentes a los medicamentos.
- No se ha demostrado que sea seguro el uso de CONVENIA® en perros y gatos de menos de 4 meses de edad ni en animales reproductores o hembras gestantes o lactantes.
- No se ha establecido la seguridad para administración intramuscular (IM) ni intravenosa (IV), ni los efectos a largo plazo en el sitio de la inyección.
- CONVENIA® se elimina lentamente del cuerpo, requiriendo aproximadamente 65 días para eliminar del cuerpo 97% de la dosis administrada. Los animales que presentan eventos adversos pueden requerir monitoreo durante este tiempo. Se ha demostrado en un sistema experimental *in vitro* que CONVENIA® lleva a un incremento en las concentraciones libres de carprofeno, furosemida, doxiciclina y ketoconazol. El uso concurrente de estos u otros medicamentos con alto grado de enlace a proteínas (por ejemplo, AINES, propofol, medicamentos cardiacos, anticonvulsivantes y medicamentos para el comportamiento) pueden competir con el enlace del cefovecin y causar eventos adversos. Se deberá supervisar y registrar (monitorear) la compatibilidad entre medicamentos.

zoetis

CONVENIA®

Cefovecin Sódico

Reg. Q-1196-110. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Antimicrobiano de amplio espectro y larga acción para perros y gatos.

ADVERTENCIAS

- No es para uso en humanos.
- Consultar al Médico en caso de exposición accidental en seres humanos.
- Para minimizar la posibilidad de reacciones alérgicas, se recomienda que las personas que manejan dichos antimicrobianos, incluyendo el Cefovecin, eviten el contacto directo de piel y membranas mucosas con el producto.
- Los fármacos antimicrobianos, incluyendo a las penicilinas y a las cefalosporinas pueden causar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Su venta requiere receta médica.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en refrigeración entre 2 y 8 °C (36 y 46 °F) antes y después de reconstituir el producto en su caja original.
- Utilizar todo el contenido del frasco durante los 56 días posteriores a su reconstitución.
- CONVENIA® debe estar protegido de la luz.
- Después de usar este producto es importante devolverlo al refrigerador, en su caja original. Como ocurre con otras cefalosporinas, el color de la solución puede variar de clara a ámbar al momento de reconstituirla y se puede oscurecer con el tiempo. Si se almacena de acuerdo con las recomendaciones, el color de la solución no afecta adversamente a la potencia.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Desechar el envase de acuerdo a las regulaciones locales.

zoetis