

CYTOPOINT®

10 mg Reg. B-1196-401. 20 mg Reg. B-1196-402. 30 mg Reg. B-1196-403. 40 mg Reg. B-1196-404. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina / Dermatitis Alérgica Canina

FÓRMULA

Cada dosis (1 ml) contiene a la liberación:

CYTOPOINT® 10 mg		
Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica/Alérgica Canina	Cepa 34D3 Clon 15	≥ 10.0 mg
CYTOPOINT® 20 mg		
Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica/Alérgica Canina	Cepa 34D3 Clon 15	≥ 20.0 mg
CYTOPOINT® 30 mg		
Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica/Alérgica Canina	Cepa 34D3 Clon 15	≥ 30.0 mg
CYTOPOINT® 40 mg		
Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica/Alérgica Canina	Cepa 34D3 Clon 15	≥ 40.0 mg
Excipiente c.b.p./c.s.p.		1 ml



DESCRIPCIÓN

CYTOPOINT® es un líquido estéril, listo para usar, que contiene un anticuerpo monoclonal caninizado (mAb) contra la interleucina-31 (IL-31). Estudios de laboratorio han demostrado que la IL-31 induce prurito en perros.

CYTOPOINT® permanece en la circulación durante varias semanas. Ejerce un efecto terapéutico al enlazar y neutralizar a la IL-31 soluble, inhibiendo así el prurito y reduciendo las lesiones en la piel. Al igual que otros anticuerpos y complejos anticuerpo-antígeno naturales, su eliminación es por las vías normales de degradación de las proteínas.

INDICACIONES

Este producto ha demostrado ser efectivo para el tratamiento de perros contra la dermatitis alérgica y la dermatitis atópica.

PRESENTACIÓN

Caja con 2 viales de 1 ml cada uno			
10 mg	20 mg	30 mg	40 mg

INDICADO EN



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- Administrar CYTOPOINT a una dosis mínima de 2 mg/kg de peso corporal.
- Repetir la administración cada 4-8 semanas, según sea necesario, en pacientes individuales.

Por razones de conveniencia, se pueden usar las siguientes tablas de dosificación como guía:

- **Para perros con un peso de <2.3 kg:** Retirar asépticamente 0.2 ml/kg de un vial de 10 mg (azul cielo) y administrar subcutáneamente. Descartar el producto restante.

CYTOPOINT®

10 mg Reg. B-1196-401. 20 mg Reg. B-1196-402. 30 mg Reg. B-1196-403. 40 mg Reg. B-1196-404. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina / Dermatitis Alérgica Canina

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Perros con un peso de 2.3-18.1 kg: Retirar asépticamente el volumen entero del vial correspondiente, según la siguiente tabla de dosificación y administrar subcutáneamente.

PESO CORPORAL DEL PERRO (Kg)	PRESENTACIÓN			
	10 mg azul cielo	20 mg ciruela	30 mg rosa	40 mg azul marino
2.3 - 4.5	1 vial			
4.6 - 9.1		1 vial		
9.2 - 13.6			1 vial	
13.7 - 18.1				1 vial

Perros con un peso de > 18.1 kg: Una sola dosis requiere de una combinación de viales, como se indica en la siguiente tabla. Antes de la administración, se debe tomar el número de viales indicado según cada presentación y de acuerdo con el peso del perro.

PESO CORPORAL DEL PERRO (Kg)	PRESENTACIÓN			
	10 mg azul cielo	20 mg ciruela	30 mg rosa	40 mg azul marino
18.2 - 22.7	1 vial +			1 vial
22.8 - 27.2		1 vial +		1 vial
27.3 - 31.7			1 vial +	1 vial
31.8 - 36.3				2 viales
36.4 - 40.8	1 vial +			2 viales
40.9 - 45.4		1 vial +		2 viales
45.5 - 49.9			1 vial +	2 viales
50.0 - 54.4				3 viales
54.5 - 59.0	1 vial +			3 viales
59.1 - 63.5		1 vial +		3 viales
63.6 - 68.0			1 vial +	3 viales
68.1 - 72.6				4 viales
72.7 - 77.1	1 vial +			4 viales
77.2 - 81.6		1 vial +		4 viales
81.7 - 86.2			1 vial +	4 viales
86.3 - 90.7				5 viales

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- El producto no tiene conservadores. Cada vial es para un solo uso. Inactivar el contenido no utilizado.
- Este producto es sólo para uso vía subcutánea.
- Use el contenido entero después de abrir.
- Se deben usar jeringas y agujas esterilizadas para administrar este producto. No usar agentes químicos para esterilizar, ya que las trazas de desinfectantes pueden inactivar el producto.
- Este producto no ha sido probado en hembras gestantes, lactantes ni en animales para reproducción.
- Para uso bajo la supervisión de un Médico Veterinario.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Su venta requiere receta médica

ALMACENAMIENTO

- Almacenar verticalmente de 2 a 8 °C. La exposición prolongada a temperaturas más altas o a la luz directa del sol puede afectar adversamente su potencia.
- No congele.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Disponer de los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.