ELEKTRIL INYECTABLE LLAGUNO

Solución inyectable electrolítica, rehidratante y energética para animales de producción

Laboratorio Llaguno | Via IV / SC

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Solución electrolítica parenteral formulada para la reposición rápida de líquidos, minerales y energía en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Presentación: Frasco inyectable de uso veterinario.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición activa por 100 ml:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Cloruro de sodio (2,5 g)	Reposición de sodio y restauración del volumen extracelular perdido por deshidratación.
Cloruro de calcio (0,27 g)	Soporte de la función neuromuscular y cardiovascular.
Cloruro de magnesio (0,15 g)	Cofactor enzimático; mantiene el equilibrio electrolítico celular.
Acetatos de sodio y potasio (3,1 g)	Acción alcalinizante; corrige la acidosis metabólica.
Glucosa (25 g)	Aporte energético inmediato para tejidos y órganos vitales.

MECANISMO DE ACCIÓN Y BENEFICIOS SANITARIOS

La combinación de electrolitos y glucosa restablece con rapidez el balance hidroelectrolítico, corrige la acidosis metabólica y aporta energía de uso inmediato. Esto favorece una recuperación clínica más rápida en animales deshidratados, febriles o debilitados, reduciendo las pérdidas productivas asociadas a estos cuadros.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Deshidratación por diarrea, vómito o reducción en la ingesta de agua.
- Estados febriles y procesos infecciosos con pérdida de electrolitos.
- Soporte energético en animales debilitados, en ayuno prolongado o post-parto.
- Recuperación posterior a cirugías, traumatismos o estrés de transporte.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía	Dosis Recomendada
Intravenosa (IV), subcutánea (SC) o irrigación	De 40 a 50 ml por kg de peso vivo al día, en bovinos, equinos, porcinos y ovinos, bajo supervisión del médico veterinario.

PRECAUCIONES Y PERÍODO DE RETIRO

Precauciones
Uso exclusivamente veterinario. No exceder la dosis indicada. Administrar con velocidad controlada por vía intravenosa para evitar sobrecarga circulatoria.

Período de retiro
Respetar los tiempos de retiro de carne y leche establecidos por la normativa vigente antes del consumo humano.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- Utilice guantes protectores durante la aplicación del producto.
- Evite el contacto directo con la piel, ojos y mucosas del operador. En caso de salpicadura, lavar con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO

- Conservar el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a temperatura inferior a 30°C.

Recomendación Sanitaria

Corregir a tiempo la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos con Elektril Inyectable previene complicaciones metabólicas, acelera la recuperación clínica y protege el bienestar y la productividad del hato.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.