LESPORINA L

Antibiótico intramamario para mastitis en vacas en lactancia

California | Intramamaria

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio California.

Clasificación Farmacológica: Antimicrobiano intramamario con cefoperazona sódica, cefalosporina de tercera generación para mastitis por bacterias sensibles.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición por jeringa de 10 ml:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Cefoperazona sódica (250 mg)	Cefalosporina con actividad frente a bacterias sensibles; actúa sobre la síntesis de la pared bacteriana.
Excipientes c.s.p. 10 ml	Vehículo en cantidad suficiente para completar el contenido de una jeringa intramamaria.

MECANISMO DE ACCIÓN Y BENEFICIOS SANITARIOS

La cefoperazona inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Lesporina L está descrita para tratar y controlar mastitis en vacas en lactancia causada por microorganismos sensibles. Su selección requiere valoración veterinaria y, cuando corresponda, pruebas de sensibilidad. El tratamiento no permite destinar la leche a consumo sin cumplir el retiro aplicable.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Mastitis en vacas en lactancia por bacterias sensibles, bajo diagnóstico veterinario.
- Patógenos descritos: Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae y S. uberis.
- Patógenos descritos: Staphylococcus aureus y Escherichia coli, si son sensibles.
- Otros descritos: Pseudomonas aeruginosa y Trueperella pyogenes, según sensibilidad.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía	Dosis Recomendada
Intramamaria, en el cuarto afectado.	Tras ordeño a fondo y asepsia del pezón, aplicar el contenido total de una jeringa por cuarto afectado y masajear suavemente. Pauta publicada: repetir a las 24 o 48 horas si procede, según criterio veterinario y etiqueta.

PRECAUCIONES Y PERÍODO DE RETIRO

Precauciones

Uso veterinario en lactancia. No exceder la pauta. Identificar los animales tratados y confirmar contraindicaciones, técnica y duración con el veterinario.

Período de retiro

Las fuentes consultadas no especifican retiro de leche o carne. Confirmar etiqueta y fabricante; separar la leche y no destinarla a consumo durante el retiro.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- Usar guantes y realizar limpieza y desinfección del pezón antes de aplicar.
- Mantener la jeringa sin contaminación y seguir la técnica intramamaria indicada por el veterinario. Eliminar residuos conforme a normativa.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y protegido de la luz, según etiqueta. Mantener fuera del alcance de niños y comprobar integridad del envase.

Recomendación Sanitaria

Integrar Lesporina L a un programa veterinario de control de mastitis que incluya higiene de ordeño, identificación de vacas tratadas y gestión de leche descartada. Verificar la respuesta y los tiempos de retiro antes de reincorporar leche a consumo.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.