MITGAN 50 ANABÓLICO

Solución veterinaria inyectable con boldenona undecilinato

California | Vía IM

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio California.

Clasificación Farmacológica: Anabólico veterinario inyectable a base de boldenona undecilinato, como coadyuvante en estados que requieren estimular la síntesis proteica.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición por 1 ml:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Boldenona undecilinato (50 mg)	Agente anabólico relacionado con la estimulación de síntesis proteica y retención de nitrógeno.
Excipientes c.s.p. 1 ml	Vehículo en cantidad suficiente para completar 1 ml de solución inyectable.

MECANISMO DE ACCIÓN Y BENEFICIOS SANITARIOS

La boldenona ejerce acción anabólica vinculada al metabolismo proteico y mantenimiento del tejido muscular. Mitgan 50 se describe como coadyuvante en debilidad, pérdida de peso y convalecencia. Su empleo requiere diagnóstico y supervisión veterinaria, junto con nutrición adecuada; no sustituye el tratamiento de la causa de base ni garantiza ganancias de peso específicas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Coadyuvante en debilidad, pérdida de peso y estados de estrés, según valoración veterinaria.
- Apoyo en convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas y postoperatorios.
- Coadyuvante en raquitismo, osteomalacia y fracturas, conforme a diagnóstico profesional.
- Uso en bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos según autorización de etiqueta local.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía	Dosis Recomendada
Intramuscular.	Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1 ml por cada 90 kg de peso vivo. Pauta publicada: cada 30 días, máximo 3 aplicaciones. Confirmar elegibilidad del animal y pauta con etiqueta local y médico veterinario.

PRECAUCIONES Y PERÍODO DE RETIRO

Precauciones

Uso bajo supervisión veterinaria. Confirmar restricciones en animales de consumo, reproductores y de competencia. No exceder dosis ni aplicaciones.

Período de retiro

Las fuentes consultadas no especifican retiro de carne o leche. Confirmar autorización local y retiro con fabricante antes del uso; no asumir cero días.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- Utilice guantes y material limpio durante el manejo del producto.
- Aplicar con técnica aséptica y evitar autoinyección. Eliminar agujas y residuos según indicaciones veterinarias y normativa local.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y protegido de la luz, según etiqueta. Mantener fuera del alcance de niños y separado de alimentos.

Recomendación Sanitaria

Identificar la causa de pérdida de peso o debilidad antes de utilizar Mitgan 50. Confirmar la autorización de uso del anabólico para el animal y su destino, y acompañar cualquier tratamiento con nutrición y manejo indicados por el médico veterinario.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.