RIMADYL® (CARPROFENO) TABLETAS MASTICABLES

Carprofeno

100 mg Reg. Q-1196-024; 75 mg Reg. Q-1196-026; 25 mg Reg. Q-1196-025. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Antiinflamatorio no esteroidal para el alivio del dolor e inflamación en perros.

FÓRMULA

Cada tableta contiene:

Carprofeno	100 mg
Excipientes c.b.p. (c.s.p)	1 tableta



DESCRIPCIÓN

RIMADYL® (carprofeno) es un fármaco antiinflamatorio no esteroidal (AINEs) de la familia del ácido propiónico, que incluye a ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno.

INDICACIONES

RIMADYL® (carprofeno) Tabletas Masticables está indicado para alivio del dolor y la inflamación asociados con la osteoartritis y para el control del dolor post-operatorio asociado con la cirugía ortopédica y de tejidos blandos en perros.

PRESENTACIÓN

Frascos con 60 tabletas masticables hendidas		
25 mg	75 mg	100 mg

INDICADO EN

PERROS ADULTOS

CACHORROS
A PARTIR DE 6 SEMANAS DE EDAD.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

- La dosificación recomendada para la administración oral en perros, es de 4 mg de carprofeno por kg de peso corporal, diariamente.
- La dosis diaria total debe administrarse en forma de 4 mg/kg de peso corporal una vez al día o dividirse y administrarse como 2 mg/kg dos veces al día. Para el control del dolor post-operatorio, administre aproximadamente 2 horas antes de la cirugía. Las tabletas están hendidas y la dosificación debe calcularse en incrementos de media tableta.

CONTRAINDICACIONES

- Rimadyl® no debe usarse en perros que previamente han exhibido hipersensibilidad al Carprofeno.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Todos los perros deben ser sometidos a una exhaustiva evaluación clínica antes de iniciar la terapia con AINES. Deben considerarse pruebas de laboratorio apropiadas para establecer información sobre parámetros hematológicos y bioquímicos antes, y periódicamente durante, el tratamiento con cualquier AINES.
- Debido a la naturaleza palatable de RIMADYL® (Carprofeno) Tabletas Masticables, debe almacenarse en un lugar fuera del alcance de los perros.En caso de ingerir grandes cantidades de tabletas masticables, pueden presentarse reacciones adversas severas.
- En caso de sospechar que el perro ha consumido grandes cantidades de RIMADYL® (Carprofeno) Tabletas Masticables, por favor, llame al Médico Veterinario para obtener ayuda inmediata.
- El uso concomitante de RIMADYL® (Carprofeno) Tabletas Masticables con otros medicamentos antiinflamatorios, tales como los corticosteroides y otros AINE's, debe vigilarse estrechamente.
- Su venta requiere receta médica.
- No indicado para uso humano. Consultar al médico en caso de ingestión accidental por humanos.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 a 30 °C.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

La imagen del producto es de referencia.

zoetis