SANUCH POLVO

Polvo soluble con metrifonato (triclorfón) para manejo parasitario

California | Polvo soluble

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Compañía California S.A.

Clasificación Farmacológica: Antiparasitario organofosforado en polvo soluble con metrifonato (triclorfón), para usos autorizados en la etiqueta.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición por 100 g, contrastada con Asisvet:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Metrifonato o triclorfón (97 g)	Organofosforado con acción antiparasitaria frente a organismos sensibles. Concentración: 97% p/p.
Excipientes c.s.p. 100 g	Vehículo en cantidad suficiente para completar 100 g de producto; corresponde al 3% restante.

MECANISMO DE ACCIÓN Y BENEFICIOS SANITARIOS

El metrifonato es un organofosforado que actúa por inhibición de la colinesterasa en organismos sensibles. Las fuentes consultadas describen Sanuch como antiparasitario para usos internos y externos según especie y etiqueta. Al ser un concentrado, debe prepararse y administrarse de acuerdo con las instrucciones específicas, sin asumir que puede aplicarse directamente en polvo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Control de nuches o tórsalos (Dermatobia hominis), según uso autorizado.
- Control de ácaros de la sarna, piojos y moscas sensibles al producto.
- Manejo de parasitosis gastrointestinales indicadas en la etiqueta, bajo supervisión veterinaria.
- Aplicación en especies y condiciones expresamente autorizadas por el fabricante.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía	Dosis Recomendada
Externa, como baño preparado. Otros usos: según etiqueta.	Asisvet, bovinos/parásitos externos: 15 g en 1,5 L de agua; usar 0,5 L de solución por 100 kg. Otras diluciones dependen del parásito y especie. Confirmar etiqueta y veterinario. No espolvorear ni extrapolar al uso oral.

PRECAUCIONES Y PERÍODO DE RETIRO

Precauciones
Organofosforado: no exceder concentración ni dosis. Verificar contraindicaciones e interacciones con el veterinario. No improvisar vías de uso.

Período de retiro
Catálogo: 14 días para sacrificio; no verificado en etiqueta. Confirmar retiro de carne y leche antes del uso. Aplicar después del ordeño no sustituye el retiro.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- Usar protección personal conforme a etiqueta al manipular y preparar el polvo.
- Evitar inhalación y contacto con ojos o piel. Ante exposición o signos de intoxicación, acudir a atención médica con el envase.

ALMACENAMIENTO

- Conservar según etiqueta, separado de alimentos y piensos. Mantener fuera del alcance de niños y evitar contaminación de agua y ambiente.

Recomendación Sanitaria

Confirmar el parásito y las instrucciones de la etiqueta local antes de usar Sanuch. Integrar el tratamiento al manejo sanitario del hato y de las instalaciones; nunca trasladar diluciones entre especies, vías o indicaciones sin supervisión veterinaria.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.