
LABORATORIOS
SERVINSUMOS

Hemopar B12®

Controla ANAPLASMOSIS, TRIPANOSOMIASIS Y BABESIOSIS
Solución inyectable





LABORATORIOS
SERVINSUMOS



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Diminazene Diaceturato ..... 40 mg
Oxitetraciclina base ..... 100 mg
Antipirina ..... 150 mg.
Cianocobalamina (Vit. B12) ..... 15 mcg.
Excipientes, c.s.p. ..... 1 mL.

INDICACIONES

Su uso está indicado en el tratamiento y recuperación de animales afectados por hemoparasitos. Altamente efectivo en el tratamiento de la anaplasmosis (ranilla blanca, fiebre de garrapata, huequera, secadera), de la babesiosis (ranilla roja, fiebre de garrapata, tristeza bovina, hemoglobinuria, piroplasmosis) y de la tripanosomiasis (secadera, mal de caderas).

ADMINISTRACIÓN

Hemopar – B 12 debe aplicarse por vía intramuscular profunda. Se recomienda no inyectar más de 20 mL en un solo sitio.

DOSIS

Hemopar – B 12 debe aplicarse a la dosis de 1 mL por cada 13 kilos de peso vivo. Por regla general con una sola aplicación se consigue la recuperación del animal.

PRECAUCIONES

El Diaceturato de Diminazene es tóxico para el sistema nervioso, ya que puede inducir ataxia y convulsiones. Tiene además la característica de provocar una súbita disminución de la presión sanguínea.
Por estas razones, se prefiere no aplicarla por vía intravenosa. Se ha informado hipersensibilidad al fármaco en bovinos sobre todo, pero no se destaca esta situación en otras especies. Aunque los bovinos son los más resistentes al efecto tóxico, se han informado muertes con dosis no mayores de 2 o 3 veces la dosis terapéutica. Los síntomas de intoxicación aparecen de 24 a 72 horas después de la inyección y los animales presentan, nistagmus y a veces convulsiones; en la necropsia hay presencia de extensas hemorragias en el mesencéfalo y el diencéfalo.
Las tetraciclinas son consideradas atóxicas. Las preparaciones son irritantes para aplicación intramuscular.
A veces la inyección intramuscular de Oxitetraciclina de larga acción puede producir abscesos estériles, a menudo involucrando el nervio (popliteo), lo cual genera cojeras y parálisis flácida permanentes. Es entonces necesario puntualizar que no se deben usar estas preparaciones en pequeñas especies.

LABORATORIOS
SERVINSUMOS

PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano en los 21 días siguientes a la finalización del tratamiento.
La leche solamente puede utilizarse 6 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100, 50 y 30 mL.

ESPECIES



Reg ICA N° 4652 DB