

IVERSHAMPOO

ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
SHAMPOO
REG.SAN: 3B-11099-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	1.50 g
Clorhexidina	0.44 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: En caso de parásitos externos aplicar vía tópica: 500 µg/Kg de peso (0,03 mL de IVERSHAMPOO / Kg), 2 veces con intervalo de 2 semanas. Aplicar en forma generosa sobre el pelaje y piel del animal completamente mojado, dando masaje vigoroso hasta lograr abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos (no exceder este tiempo) y enjuagar hasta remover todo el producto. Repetir el procedimiento una vez más y enjuagar el pelaje del animal hasta dejarlo libre de shampoo. Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y posibilidad de reinfestaciones, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES DE USO

IVERSHAMPOO está indicado en el control y tratamiento de pulgas, garrapatas, piojos y sarna en caninos y felinos. Además, posee efecto antiséptico gracias a la clorhexidina.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica

FARMACOCINÉTICA

Ivermectina: en mamíferos, la terapia con ivermectina es bien tolerada ya que la ubicación de los canales iónicos asociados a Glu y los canales de Cl asociados a GABA está restringida en el sistema nervioso central. La ivermectina es incapaz de atravesar la barrera hematoencefálica gracias a la presencia de la glicoproteína P (P-gp), que actúa como bomba de e-flujo en la membrana de las células endoteliales de los capilares cerebrales, determinando que sustancias se transportarán, incluyendo la ivermectina.
Cuando se administra por vía tópica tiene una absorción lenta en comparación con otras vías (como la oral); pero conserva características lipofílicas distribuyéndose ampliamente en tejidos periféricos.
Clorhexidina: la absorción de clorhexidina a través de la piel es mínima, en caso de que se produzca una absorción sistémica, la eliminación se produce a través de la bilis o a nivel renal. La absorción digestiva es prácticamente nula, la dosis ingerida se elimina en un 90% sin alteración por las heces.

MECANISMO DE ACCIÓN

Ivermectina: favorece la liberación de ácido gamma-aminobutírico (GABA) en las neuronas presinápticas. El



IVERSHAMPOO

ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
SHAMPOO
REG.SAN: 3B-11099-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	1.50 g
Clorhexidina	0.44 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: En caso de parásitos externos aplicar vía tópica: 500 µg/Kg de peso (0,03 mL de IVERSHAMPOO / Kg), 2 veces con intervalo de 2 semanas. Aplicar en forma generosa sobre el pelaje y piel del animal completamente mojado, dando masaje vigoroso hasta lograr abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos (no exceder este tiempo) y enjuagar hasta remover todo el producto. Repetir el procedimiento una vez más y enjuagar el pelaje del animal hasta dejarlo libre de shampoo. Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y posibilidad de reinfestaciones, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

GABA actúa como un neurotransmisor inhibitorio y bloquea la estimulación postsináptica de la neurona adyacente en los nematodos o en las fibras musculares de los artrópodos. Por medio de la estimulación de la liberación del GABA, la ivermectina causa la parálisis del parásito y su eventual muerte.

Clorhexidina: es un antiséptico tópico, posee actividad contra muchas bacterias, pero, aparentemente, no tiene actividad predecible contra *Pseudomonas* o *Serratia spp.* Debido a que causa menos sequedad y, por lo general, es menos irritante que el peróxido de benzoilo, es usada algunas veces en pacientes que no pueden tolerar este último.

La clorhexidina posee algunos efectos residuales y puede permanecer activa sobre la piel después del enjuague.

A las concentraciones usuales, la clorhexidina actúa dañando las membranas citoplasmáticas bacterianas. La actividad antifúngica puede ser obtenida con una concentración igual o superior al 2%.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caninos menores de 3 meses de edad, así como en caninos adultos de la raza Collie y sus cruces.

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

No administrar a pacientes con hipersensibilidad a los activos.

No se debe utilizar en hembras en lactancia o que estén cercanas al parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la ivermectina.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS



IVERSHAMPOO

ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
SHAMPOO
REG.SAN: 3B-11099-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	1.50 g
Clorhexidina	0.44 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: En caso de parásitos externos aplicar vía tópica: 500 µg/Kg de peso (0,03 mL de IVERSHAMPOO / Kg), 2 veces con intervalo de 2 semanas. Aplicar en forma generosa sobre el pelaje y piel del animal completamente mojado, dando masaje vigoroso hasta lograr abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos (no exceder este tiempo) y enjuagar hasta remover todo el producto. Repetir el procedimiento una vez más y enjuagar el pelaje del animal hasta dejarlo libre de shampoo. Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y posibilidad de reinfestaciones, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

Evitar la administración concurrente con otro ectoparasiticida tópico.

REACCIONES ADVERSAS

La hipersensibilidad y las reacciones irritativas locales son posibles en pacientes sensibles.
La posibilidad de irritación se incrementa a medida que aumenta la concentración de la clorhexidina; no se recomienda su uso durante un tiempo prolongado, en particular sobre tejido de granulación.

RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Cojín x 25 ml (caja x 66)
Sachet x 30 ml
Frasco x 120 ml