MALBAN

INTEROC
UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

ACCIÓN FITOSANITARIA: MALBAN es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de arroz y potreros.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: MALBAN está formulado como polvo mojable, con una concentración de 500 gramos de ingrediente activo por kilo de producto comercial.

NOMBRE COMÚN: Metsulfuron-metil.

MODO DE ACCIÓN: MALBAN es de la familia de las sulfonilureas, es sistémico ya que es tomado por el follaje y raíces, es movilizado rápidamente por la planta. Es un fuerte inhibidor de la división celular y el control de las malezas susceptibles, ocurre en los puntos de crecimiento de tallos y raíces. El efecto visual del control toma alrededor de 8 días, sin embargo las plantas tratadas cesan su crecimiento inmediatamente después de la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar **MALBAN** en post-emergencia total desde que el arroz tenga de 4-5 hojas, 15 días después de germinado hasta los 35 días y que las malezas tengan máximo 3-4 hojas. El lote de terreno debe estar drenado antes de la aplicación para que la lámina de agua no cubra las malezas y evite que el producto entre en contacto con las mismas.

VENTAJAS: MALBAN presenta una serie de ventajas que lo colocan como el herbicida post-emergente ideal para el control de malezas de hoja ancha en arroz y potreros:

- Alta selectividad a los cultivos de arroz cuando se usa en dosis recomendadas.
- Excelente residualidad.
- Baja volatilidad.
- Compatible con herbicidas utilizados en arroz.
- No contamina aguas subterráneas.
- Baja toxicidad.
- Se degrada rápidamente en el suelo.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con la mayoría de los herbicidas utilizados en arroz, ya sea pre-emergentes como post-emergentes, tales como PROPAROC (Propanil), BASIC (Butaclor), RILAX (Bispiribac), BELGRAN (Benzafluron metil).

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III.

PRECAUCIONES:

- No asperjar cuando hay mucho viento.
- No aplicar a plantas con estrés, mal nutridas o enfermas.
- No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30 ºC.
- Evitar la deriva de la aspersión hacia cultivos vecinos.
- Durante el manipuleo y aplicación evitar comer, beber y fumar.
- Evitar la contaminación de la piel y los ojos.
- No inhalar.
- Lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.
- Evitar la contaminación de otros plaguicidas, fertilizantes y semillas.

INTERVALO DE SEGURIDAD: 30 días entre la aplicación y la cosecha.

PRESENTACIÓN:
Sobres x 18 gramos en bolsa hidrosoluble.

REGISTRO MAGAP: 072-H10-NA.

FABRICADO POR: IPESA.

DISTRIBUIDO POR: INTEROC S.A.

RECOMENDACIONES DE USO PARA MALBAN:

CULTIVO	MALEZAS CONTROLADAS		APLICACIÓN	DOSIS
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
ARROZ	Lechosa Bledo Clavito Botoncillo Botón blanco Buche de gallina Coquito Arrocillo Cortadera	*Euphorbia heterophylla* *Amaranthus hybridus* *Jussiae linifolia* *Caperonia palustres* *Eclipta alba* *Heteranthera reniformes* *Cyperus rotundus* *Fimbristylis milicia* *Cyperus feraz*	Post-emergencia	18 g/ha