

NEUMOPIG

BACTERINA PARA PREVENCIÓN NEUMONÍA
SUSPENSIÓN INYECTABLE
REG. SAN: 4C-13648-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada dosis contiene:

Mycoplasma hyopneumoniae	1-5 X 10^8 UFC
Vehículo c.s.p.	2 mL

ESPECIES

DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
PRIMOVACUNADOS		
ESPECIE	**VOLUMEN**	**APORTE (*Mycoplasma hyopneumoniae*)**
LECHONES A partir de la primera semana de edad. (7 días de edad)	2 mL	1 a 5 x 10^8 UFC/mL
CERDAS PREÑADAS (6 y 2 semanas antes del parto)	4 mL	
REVACUNACIÓN		
LECHONES (21 días de nacidos) 15 días luego de la primera dosis	2 mL	1 a 5 x 10^8 UFC/mL
HEMBRAS (Antes de cada parto)	2 mL	
MACHOS REPRODUCTORES (Cada 6 meses)	2 mL	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular		

INDICACIONES DE USO

NEUMOPIG es una bacterina indicada para la prevención de la neumonía en cerdos, ocasionada por *Mycoplasma hyopneumoniae.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La neumonía enzoótica en porcina es una de las enfermedades más comunes que afecta a los cerdos en todo el mundo. Se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a los porcinos jóvenes predisponiéndolos a infecciones bacterianas secundarias.
La neumonía enzoótica es un síndrome con baja mortalidad, pero con grave impacto en los parámetros productivos en los cerdos de engorde, disminuyendo la ganancia media diaria y eficiencia

MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Mycoplasma hyopneumoniae*, evitando la presentación de neumonía enzoótica en porcinos.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

Use todo el contenido, queme los envases y contenido no usado.



NEUMOPIG

BACTERINA PARA PREVENCIÓN NEUMONÍA
SUSPENSIÓN INYECTABLE
REG. SAN: 4C-13648-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada dosis contiene:

Mycoplasma hyopneumoniae	1-5 X 10^8 UFC
Vehículo c.s.p.	2 mL

ESPECIES

DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
PRIMOVACUNADOS		
ESPECIE	**VOLUMEN**	**APORTE (*Mycoplasma hyopneumoniae*)**
LECHONES A partir de la primera semana de edad. (7 días de edad)	2 mL	1 a 5 x 10^8 UFC/mL
CERDAS PREÑADAS (6 y 2 semanas antes del parto)	4 mL	
REVACUNACIÓN		
LECHONES (21 días de nacidos) 15 días luego de la primera dosis	2 mL	1 a 5 x 10^8 UFC/mL
HEMBRAS (Antes de cada parto)	2 mL	
MACHOS REPRODUCTORES (Cada 6 meses)	2 mL	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular		

No aplicar en animales enfermos.
No congelar.

INTERACCIONES

No reportado.

REACCIONES ADVERSAS

En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

RETIRO

21 días antes del sacrificio.

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frasco de 10 mL (5 dosis)
- Frascos de 20 mL (10 dosis)
- Frascos de 50 mL (25 dosis)
- Frascos de 100 mL (50 dosis)