

NEWCASTLE FARBIOVET

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL NEWCASTLE
LIOFILIZADO + DILUYENTE
REG. SAN: 4A-9864-AGROCALIDAD

FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Virus vivo modificado atenuado de Newcastle cepa La Sota Tipo B1 con título mayor a >1X10$^{5.5}$ DIEP 50%, origen embrión de pollo SPF.

Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES

DOSIS

DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
1 gota o 0,05 mL equivale a 1 dosis	Intranasal, Conjuntival

EN EL AGUA DE BEBIDA

		Número de dosis igual al número de aves			
Semana	Dosis	50	100	500	1000
1 era.	Vol. de agua	1,0 L	2,0 L	10,0 L	20,0 L
2 da.		1,5 L	2,9 L	14,7 L	29,4 L
3 era.		2,2 L	4,4 L	22,1 L	44,1 L
4 ta.		2,9 L	5,9 L	29,4 L	58,8 L

Se aplica la vacuna en el 50% del agua que se va a consumir en un día.

INDICACIONES DE USO

Vacuna para la prevención de la enfermedad de Newcastle. Puede ser administrada en aves de diferentes edades de acuerdo a los planes de vacunación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intranasal, Intraocular, Oral o en Aerosol.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La enfermedad de Newcastle es una infección altamente contagiosa que afecta a las aves. Se puede presentar en tres formas: lentogénica o leve, mesogénica o moderada, y velogénica o muy virulenta. Los síntomas aparecen entre dos y doce días después de la exposición y se propaga rápidamente al resto de la parvada.
Algunas cepas del virus atacan el sistema nervioso; otras, el sistema respiratorio o digestivo. Los signos clínicos incluyen: jadeo, tos, estornudos, parálisis de alas y patas, cuello torcido, espasmos, parálisis, diarrea, interrupción parcial o completa de la producción de huevos.

MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula una replicación baja del virus en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindado así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural al virus del Newcastle.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES



NEWCASTLE FARBIOVET

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL NEWCASTLE
LIOFILIZADO + DILUYENTE
REG. SAN: 4A-9864-AGROCALIDAD

FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Virus vivo modificado atenuado de Newcastle cepa La Sota Tipo B1 con título mayor a >1X10$^{5.5}$ DIEP 50%, origen embrión de pollo SPF.

Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES

DOSIS

DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
1 gota o 0,05 mL equivale a 1 dosis	Intranasal, Conjuntival

EN EL AGUA DE BEBIDA

		Número de dosis igual al número de aves			
Semana	Dosis	50	100	500	1000
1 era.	Vol. de agua	1,0 L	2,0 L	10,0 L	20,0 L
2 da.		1,5 L	2,9 L	14,7 L	29,4 L
3 era.		2,2 L	4,4 L	22,1 L	44,1 L
4 ta.		2,9 L	5,9 L	29,4 L	58,8 L

Se aplica la vacuna en el 50% del agua que se va a consumir en un día.

Aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto.
No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser desechados.
No congelar.
No vacunar animales enfermos, solo animales sanos.

INTERACCIONES

No reportado.

REACCIONES ADVERSAS

En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.
No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

RETIRO

No vacunar 21 días antes del sacrificio de las aves destinadas al consumo humano.

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frascos de 25 dosis
- Frascos de 50 dosis
- Frascos de 100 dosis
- Frascos de 500 dosis
- Frascos de 1000 dosis
- Frascos de 2500 dosis