
Un SuperGanadero aumenta su productividad



SELECTIVAS SOLUCIONES Y EFECTIVAS

Este producto no daña el pasto.
Es confiable para el ganado, siempre que siga
las instrucciones de uso de acuerdo a la etiqueta.

Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Capacitaciones continuas.





SuperRápido: Contundente contra la maleza, rentable con sus potreros

RED DE **CUSTODIA**
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO

Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



CampoLimpio℠
PROGRAMA DE MANEJO DE ENVASES VACIOS

Corteva Agriscience de Ecuador S.A. / Guayaquil - Ecuador / Pastar™ D - Reg. Nac. 127-H1/NA-CL1 - Cat. Tox. III - Franja Azul.
EN CASO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS LLAME AL 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Pastar™ D

HERBICIDA

Combate las malezas **desde las más suaves hasta las más leñosas**, para pastos más verdes y más productivos

CORTEVA™ agriscience

Visítenos en corteva.ec

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2021 Corteva

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en www.corteva.ec

TM ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

Súper Ganadería™

EQ ECUAQUIMICA
La mano amiga

Pastar™ D

HERBICIDA

Herbicida sistémico, recomendado para el control de malezas de hoja ancha, selectivo al pasto, potente y con efecto prolongado.
Pastar™ D incrementa la carga de pasto por potrero (ton/ha), lo cual repercute en mayor ganancia de peso y/o producción de leche con una mejor rentabilidad para el ganadero. **Pastar™ D** pertenece a la familia **Súper Ganadería™**.

Antes



Después



Recomendaciones de uso

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.
Pasto saboya *(Panicum maximum)*	**Escoba Dura** *(Sida acuta)*	3.0-4.0 L/ha	3 días
	Dormidera *(Mimosa pudica L)*	2 L/ha	
	Frijolillo *(Senna obtusifolia)*	2 L/ha	
	Malva *(Urena lobata)*	2 L/ha	
	Torito *(Melochia pyramidata)*	3 L/ha	


*Dosis por 400 litros de agua por hectárea
Se recomienda una sola aplicación por ciclo de cultivo, en post emergencias en potreros.
PERIODO DE CARENCIA:
• No cosechar el pasto dentro de 3 días de aplicación de Pastar D
• No mover animales de pastoreo de áreas tratadas con Pastar D a las zonas donde se producen cultivos de hoja ancha sensible sin tratar, sin antes permitir 3 días
de pastoreo.
PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda guardar un periodo de 24 horas para reingresar al área tratada.

Beneficios de usar Pastar™ D



- Control efectivo contra Escoba, Torito y Malva.
- Con un solo producto se controla un gran espectro de malezas, incluyendo Escoba negra.
- Mayor capacidad de carga en menor tiempo.
- Control duradero.
- La mejor opción para controlar malezas en mantenimiento.
- Potreros más verdes y productivos.
- Ideal para fincas que buscan certificación de buenas prácticas ganaderas.

Principales malezas que controla Pastar™ D



Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería en la aplicación de Pastar™ D

