

PRAZPIR

ENDOPARASITICIDA
SUSPENSIÓN ORAL
REG. SAN: 3A1-3A2-10783-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Pamoato de pirantel	8 g
Praziquantel	3 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN	
Canino	1 mL por cada 5 Kg de peso
Felino	0,25 mL por cada Kg de peso
DOSIS ÚNICA	

INDICACIONES DE USO

Está indicado en el tratamiento y control de parasitosis internas en caninos y felinos. Controla nematodos gastrointestinales y cestodos.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral

FARMACOCINÉTICA

Pamoato de pirantel: no es tan bien absorbido desde el tracto gastrointestitnal, lo que impide que la droga alcance la parte más distal del tracto en caninos, felinos y equinos. La droga se metaboliza con rapidez y se excreta en la orina y en las heces.
Praziquantel: es absorbido con rapidez y casi por completo después de la administración oral, aunque sufre un significativo efecto de metabolismo de primer paso. Los niveles séricos máximos son alcanzados en 30 a 120 minutos en los perros. Se distribuye por todo el cuerpo, cruza la pared intestinal y atraviesa la barrera hematoencefálica para alcanzar el SNC.
Se metaboliza en el hígado a metabolitos con actividad desconocida. Es excretado principalmente por orina; la vida media de eliminación en el perro es, aproximadamente de 3 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Pamoato de pirantel: actúa como bloqueante neuromuscular despolarizante en parásitos susceptibles, a los que paraliza. Posee propiedades nicotínicas y actúa en forma similar a la acetilcolina. También inhibe la colinesterasa.



PRAZPIR

ENDOPARASITICIDA
SUSPENSIÓN ORAL
REG. SAN: 3A1-3A2-10783-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Pamoato de pirantel	8 g
Praziquantel	3 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN	
Canino	1 mL por cada 5 Kg de peso
Felino	0,25 mL por cada Kg de peso
DOSIS ÚNICA	

Se ha utilizado para la eliminación de los siguientes parásitos en caninos: áscaris *(Toxocara canis, Toxocara leonina),* anquilostomos *(Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala)* y gusano gástrico *(Physaloptera).* Es efectivo contra formas parasitarias maduras e inmaduras.
Praziquantel: su mecanismo de acción contra cestodos no ha sido determinado, pero podría ser el resultado de la interacción con los fosfolípidos en el tegumento del parásito, lo que ocasiona un flujo de iones de sodio, potasio y calcio.
En bajas concentraciones *in vitro* parece deteriorar la función de las ventosas y estimular la motilidad del parásito.
En concentraciones más altas *in vitro* aumenta la contracción (irreversible en concentraciones muy altas) de la estrobila (cadena de proglótides) del parásito.
El praziquantel ocasiona una vacuolización focal irreversible con la posterior desintegración del cestodo en sitios específicos de su tegumento.
En los esquistosomas y trematodos, el praziquantel mata directamente al parásito, posiblemente por aumento del flujo de iones de calcio hacia el interior de éste. Y sigue la vacuolización focal del tegumento y luego el parásito es fagocitado.
El praziquantel está indicado para el tratamiento de *Dipylidium caninum, Taenia pisiformis* y *Echinococcus granulosis* en perros. No se requiere ni se recomienda ayuno antes de la administración.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
No administrar a pacientes con hipersensibilidad al activo.
No administrar a caninos menores de 4 semanas de edad.
No administrar a animales debilitados.



PRAZPIR

ENDOPARASITICIDA
SUSPENSIÓN ORAL
REG. SAN: 3A1-3A2-10783-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Pamoato de pirantel	8 g
Praziquantel	3 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ESPECIES

DOSIS

DOSIFICACIÓN	
Canino	1 mL por cada 5 Kg de peso
Felino	0,25 mL por cada Kg de peso
DOSIS ÚNICA	

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

En las personas, se produce actividad sinérgica entre el praziquantel y la oxamniquina en el tratamiento de esquistosomiasis. La importancia clínica de este sinergismo en pacientes veterinarios no está clara.

REACCIONES ADVERSAS

En las dosis indicadas, los activos no suelen ocasionar efectos adversos.
En casos de sobredosificación se podrían presentar: vómitos, diarrea, náuseas, hipersalivación, debilidad y decremento del apetito.

RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Jeringa x 2 ml
Jeringa x 5 ml
Jeringa x 10 ml
Frasco x 250 ml