

PULGA OUT TALCO

ANTIPARASITARIO EXTERNO
POLVO
REG. SAN: 3B1-2-10900-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Fipronil	0.6 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES



DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Espolvorear sobre el animal de manera suficiente. Aplicar de forma generosa en la cama del animal o el lugar donde reposa. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación o según la recomendación del Médico Veterinario. En mascotas se puede utilizar después de salidas a exteriores (parques, bosques, etc).

Vía tópica.

INDICACIONES DE USO

PULGA OUT TALCO está indicado para controlar y tratar la infestación de ectoparásitos como garrapatas, piojos masticadores y pulgas en animales domésticos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

FARMACOCINÉTICA

El fipronil se acumula en los aceites de la piel y los folículos pilosos y continúa liberándose durante un tiempo, lo que da como resultado una actividad residual prolongada. Aplicado tópicamente, el fármaco aparentemente se esparce por el cuerpo en aproximadamente 24 horas mediante translocación.

MECANISMO DE ACCIÓN

Interfiere con el paso de iones cloruro en los canales de cloruro regulados por GABA, interrumpiendo así la actividad del SNC.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia al principio activo (fipronil). No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
Producto moderadamente tóxico, uso externo únicamente. En caso de intoxicación consulte al médico y entregue la etiqueta del producto.
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente, evite derrames. Una vez terminado el producto deseche en lugares apropiados y evite contaminar cursos de agua.



PULGA OUT TALCO

ANTIPARASITARIO EXTERNO
POLVO
REG. SAN: 3B1-2-10900-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Fipronil	0.6 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES



DOSIS

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Espolvorear sobre el animal de manera suficiente. Aplicar de forma generosa en la cama del animal o el lugar donde reposa. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación o según la recomendación del Médico Veterinario. En mascotas se puede utilizar después de salidas a exteriores (parques, bosques, etc).

Vía tópica.

En caso de salpicaduras accidentales, lave con abundante agua las partes afectadas.
No almacenar cerca de alimentos o bebidas para consumo humano.

INTERACCIONES

Dosis bajas de Amitraz han mostrado un efecto sinérgico en la velocidad del efecto garapaticida.

REACCIONES ADVERSAS

Escasos casos de hipersensibilidad han sido reportados. Puede presentarse irritación en el sitio de aplicación.

RETIRO

Carne: 12 días
Huevos: 48 días.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Sobre x 8 g (Caja x 66)
Frasco x 60 g
Frasco x 100 g