

PULGA OUT TALCO

ANTIPARASITARIO EXTERNO
POLVO TÓPICO
REG.SAN:3B1-2-10900-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Fipronil	0.6 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES

DOSIS

Espolvorear sobre el animal de manera suficiente. Aplicar de forma generosa en la cama del animal o el lugar donde reposa. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación o según la recomendación del Médico Veterinario. En mascotas se puede utilizar después de salidas a exteriores (parques, bosques, etc.)

INDICACIONES DE USO

PULGA OUT TALCO está indicado para controlar y tratar la infestación de ectoparásitos como garrapatas, piojos masticadores y pulgas en animales domésticos.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica

FARMACOCINÉTICA

Aplicado por vía tópica al parecer se disemina por todo el cuerpo, en aproximadamente, 24 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

El fipronil es un antiparasitario derivado del fenilpirazol, el cual interfiere en los invertebrados con el pasaje de los iones cloruro en los canales para cloruro, regulados por el GABA; de manera que interrumpe la actividad del SNC, generando la muerte de los parásitos. Generalmente, el fipronil se acumula en la grasa de la piel y de los folículos pilosos y, continúa liberándose durante cierto tiempo, lo que da lugar a una prolongada actividad residual.

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
No administrar a pacientes con hipersensibilidad al activo.
A la aplicación, el operador debe: evitar el contacto con su piel (especialmente si ésta se encuentra lastimada), ojos y mucosas. No inhalar el producto. Lavarse bien las manos, con agua y jabón, después de la aplicación.



PULGA OUT TALCO

ANTIPARASITARIO EXTERNO
POLVO TÓPICO
REG.SAN:3B1-2-10900-AGROCALIDAD

FARBIO PHARMA

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Fipronil	0.6 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES

DOSIS

Espolvorear sobre el animal de manera suficiente. Aplicar de forma generosa en la cama del animal o el lugar donde reposa. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación o según la recomendación del Médico Veterinario. En mascotas se puede utilizar después de salidas a exteriores (parques, bosques, etc.)

Se debe evitar su uso en cachorros menores de 6 semanas de edad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han determinado.

REACCIONES ADVERSAS

Rara vez se informan reacciones de hipersensibilidad, sin embargo, podría ocurrir una irritación temporal en el sitio de aplicación en pacientes sensibles.

RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Sobre x 8 g (caja x 66 unidades)
Talco x 60 g
Talco x 100 g