QUEMAX®

INTEROC
UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

ACCIÓN FITOSANITARIA: QUEMAX® es un herbicida no selectivo de contacto para el control de todo tipo de malezas, tanto gramíneas como de hoja ancha, en cultivos agrícolas en general. Es un herbicida que pertenece a la familia de los bipiridilos, es no volátil, con acción "quemante" sobre todo tejido verde de una planta con el que entra en contacto, provocando su muerte.

NOMBRE COMÚN: Paraquat.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Está formulado como concentrado soluble, con una concentración de 276 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: QUEMAX® se absorbe muy rápidamente por el follaje y se inactiva al entrar en contacto con el suelo. Destruye la membrana celular actuando sobre la fotosíntesis. Dependiendo de la cantidad de luz, la reacción de **QUEMAX®** sobre las plantas se observa en pocos minutos, es decir si una planta recién aplicada se coloca inmediatamente bajo oscuridad total, la planta no se quema mientras no se saque a la luz, por lo tanto, es indispensable la luz para que **QUEMAX®** actúe como herbicida, debido a este fenómeno se recomienda las aplicaciones al atardecer, ya que se logra que el producto se movilice en la planta sin dañar los tejidos, consiguiendo un mejor efecto en puntos alejados de la planta por donde ingresó el producto, cuando sale el sol al siguiente día.

COMPATIBILIDAD: QUEMAX® es compatible con la mayoría de los herbicidas comúnmente usados tales como: 2,4 D Amina, Diuron, Terbultiazona y Oxifluorfen; no se debe mezclar con productos altamente alcalinos.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II.

PRECAUCIONES: QUEMAX® es dañino en caso de inhalación e ingestión. Durante la preparación y utilización del producto no comer, beber o fumar. Evitar la inhalación de la sustancia nebulizada. Evitar el contacto directo del producto con la boca, piel y los ojos; y la ingestión del mismo. Usar ropa protectora adecuada como guantes, delantal, gafas, gorra o casco y mascarilla. Antes de comer, beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

INTERVALO DE SEGURIDAD: Para ingresar al lote que fue aplicado con **QUEMAX®** es recomendable esperar que el producto se haya secado completamente, cuando se usa como desecante de cultivos, cosechar de 2 a 4 días después de la aplicación.

PRESENTACIONES:
Envase x 1 litro.
Envase x 3.8 litros (1 galón).
Envase x 19 litros.
Tanque x 200 litros.

REGISTRO MAGAP: 007-H26-SESA-U.

FABRICADO POR FORMULADOR: SINOCHEM.

DISTRIBUIDO POR: INTEROC S.A.

RECOMENDACIONES DE USO DE QUEMAX: Mezclar la dosis recomendada de **QUEMAX®** con agua completamente limpia, agregando un adherente de calidad.

CULTIVOS	DOSIS (l/ha)	OBSERVACIONES
Anuales: Arroz, maíz, tomate, pimiento, papa, algodón, soya, etc. **Perennes:** Cacao, café, banano, caucho, frutales, caña de azucar, té, palma africana, coco, etc.	1.5 - 3.0	Aplicar sobre las malezas pequeñas, antes de que germine el cultivo. Una vez germinado el cultivo, el tratamiento tiene que ser dirigido, con el cuidado de no tocar las partes verdes del cultivo.
Áreas no agrícolas, patios industriales, cunetas, canales, caminos, etc.	3.5 - 5.5	Use altos volúmenes de agua para conseguir una buena cobertura de todas las partes de las malezas.