BARENBRUG
PALAVERSICH




SEMILLAS
PARA LAS MEJORES
PASTURAS.

Megatérmicas

GRUPO BARENBRUG

Innovación Barenbrug Palaversich. Una empresa del:
ROYAL BARENBRUG GROUP - HOLANDA

Fundado en 1904 en Holanda como una empresa familiar, expandió sus actividades a los seis continentes, logrando, con treinta subsidirarias, convertirse en el principal proveedor mundial de semillas de pasturas y céspedes.



NUESTROS PRODUCTOS

BARENBRUG PALAVERSICH
SEMILLAS FORRAJERAS TEMPLADAS.
SEMILLAS FORRAJERAS MEGATÉRMICAS.
SEMILLAS DE SORGO.

BarPower SEMILLA POTENCIADA
TRATAMIENTO DE SEMILLAS.

BIOPOWER
BIOFERTILIZANTES:
MAIZ - GIRASOL - SORGO -
TRIGO - CEBADA.

Inoculantes BAR MAX
INOCULANTES PARA SOJA
ESPECÍFICO Y POR ZONA.

PALA ACTIVE TOTAL COADYUVANTE HUMECTANTE
PALA OIL TRIPLE ACCIÓN
COADYUVANTES.

BARSILAGE
INOCULANTE PARA ENSILADO.

TERÁPICOS PARA SEMILLAS

SUPERCONTROL PALAVERSICH
FUNGICIDA.
Metalaxil 35%

PALAVERSICH SUPERPLUS CURASEMILLAS
FUNGICIDA.
Tiram 12,5% - Carbendazim 12,5%

FUNGICIDA TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
PALAVERSICH TZ
FUNGICIDA.
Tebuconazole 6%

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
REBENQUE
INSECTICIDA.
Imidacloprid 60%

Tratamiento de Semillas
TECNOLOGÍA BARENBRUG BARPOWER

BarPower
SEMILLA POTENCIADA

¿Qué es la tecnología **BarPower**?

Barpower es un tratamiento innovador que incluye:

- Protectores.
- Insecticidas.
- Fungicidas.
- Micronutrientes.
- Promotores de crecimiento.

Barpower *asegura que cada semilla sea una planta.*

VENTAJAS

- Protección integral de cada semilla.
- Disponibilidad de nutrientes y promotores de crecimiento.
- Mayor eficiencia de implantación.
- Mayor uniformidad de siembra.

RESULTADOS

- Rápido establecimiento con mayor logro de plantas.
- Pasturas más productivas con larga persistencia.


BARPOWER, CADA SEMILLA UNA PLANTA.



Los ingredientes activos son liberados gradualmente generando un halo de protección temprana.

La plántula absorbe los productos disueltos en la zona radicular.

Los ingredientes activos son transportados hacia la parte aérea de la planta y distribuídos en los tejidos.



Protección contra insectos y hongos del suelo.

Control sobre complejo de insectos del suelo.

Control de insectos foliares. Repele hormigas.

15 días post emergencia

PANICUM MÁXIMUM

BARZANIA	Regímenes de uso	Implantación-Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
 V. TANZANIA	Exigente en cuanto a la fertilidad del suelo, en especial a niveles de fósforo. Requiere suelos de alta fertilidad natural o fertilizados. Preferiblemente suelos areno-arcillosos, bien drenados. Se adapta bien a regiones de clima tropical, con precipitación pluvial superior a 1.000 mm. No tolera acidez. Mediana resistencia a sequía. Densidad de siembra 6-7 Kg/ha. Producción 26 tons/MS/ha. Producción 135 tons/MV/ha.	Gramínea perenne de porte erecto amacollada. Alcanza 1,50 m de altura. Forma matas densas. Sistema radicular profundo y fibroso. Gran velocidad de implantación, a los 90 días en condiciones óptimas se puede iniciar el primer pastoreo. Gran producción de hojas:80 % de la planta. Hojas anchas sin vellosidades ni serosidades. Muy tolerante a la sombra. No tolera encharcamientos. Tolera heladas leves. Excelente palatabilidad y digestibilidad durante todo el año. En el NEA podemos decir que Tanzania ha demostrado ser la especie más confiable y productiva.	Exige una buena preparación del suelo debido al tamaño de su semilla. Preparar el suelo hasta lograr una buena cama de siembra, lo que proporcionara un mejor establecimiento. Profundidad de siembra entre 1-2 cm como máximo. El uso del rolo compactador luego de la siembra mejora el contacto con la semilla y favorece la germinación.	Pastoreo directo o rotativo para vacunos y equinos. Heno y ensilaje. No es recomendable pastorear por debajo de los 20 cm.
BARBASA	Exigente en cuanto a la fertilidad del suelo, en especial a niveles de fósforo. Requiere suelos de alta fertilidad natural o fertilizados. Preferiblemente suelos areno-arcillosos, bien drenados. No tolera acidez. Mediana resistencia a sequía. Se adapta bien a regiones de clima tropical, con precipitación pluvial superior a 1.000 mm. Densidad de siembra 6-7 Kg/ha. Producción 35 tons/MS/ha. Producción 160 tons/MV/ha.	Gramínea perenne de porte erecto amacollada. Alcanza 1,85 m de altura. Forma matas densas. Sistema radicular profundo y fibroso. Gran velocidad de implantación, a los 90 días en condiciones óptimas se puede iniciar el primer pastoreo. Gran producción de hojas el 85% de la planta son hojas. Produce un 30% más de materia seca que cv. Tanzania. Mombasa posee una mayor habilidad y eficiencia en la captación y utilización del fósforo del suelo que Tanzania. Debido a su crecimiento exuberante es más difícil de manejar que Tanzania.	Exige una buena preparación del suelo debido al tamaño de su semilla. Preparar el suelo hasta lograr una buena cama de siembra, lo que proporcionará un mejor establecimiento. Profundidad de siembra entre 1-2 cm como máximo. El uso del rolo compactador luego de la siembra, mejora el contacto con la semilla y favorece la germinación.	Pastoreo directo o rotativo para vacunos en fase de terminación. Ganado lechero y equinos. Ensilaje. No es recomendable pastorear por debajo de los 20 cm.
BARPANIC	Precipitaciones superiores a los 450 mm anuales. Como todo Panicum, requiere un mínimo de fósforo para prosperar en el suelo. Densidad de siembra 6 kg/ha.	Gran adaptación a diferentes condiciones ambientales y a sistemas de siembra. Ampliamente difundido en Córdoba, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco y Catamarca. No soporta el frío.	Prefiere las siembras con cobertura y soporta muy bien la sombra generada por monte/bosque. El rolado luego de la siembra es una práctica que da muy buenos resultados.	Mayormente durante el período de crecimiento, que va desde Septiembre a Mayo, dependiendo la región de siembra.


V. GATTON

"Excelente adaptación a gran parte de los ambientes en el norte argentino".

Megatérmicas

PANICUM COLORATUM

BARPANICUM	Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
 V. KLEIN VERDE	Precipitaciones superiores a los 500-600 mm son aconsejables.	Muy buen comportamiento en suelos sueltos.	A diferencia de la mayoría de los Panicum Máximum, BARPANICUM prefiere los ambientes abiertos y no sombreados.	Las siembras de primavera.
	Soporta condiciones extremas de frío.	Soporta bajos contenidos de sal.	Se adapta muy bien a condiciones del Sur de Córdoba, La Pampa y San Luis, entre otras provincias.	Dependiendo de la región, desde Septiembre hasta Diciembre (este último mes con cobertura).
	Excelente comportamiento como diferido y rebrote temprano.	Excelente comportamiento en regiones frescas, donde los Panicum máximum no funcionan.		

Megatérmicas

CHLORIS GAYANA

BARHODES	Responde mejor en zonas con precipitaciones por encima de los 500 mm en adelante.	Fácil implantación, siembras superficiales.	Prefiere buena preparación de suelo, aunque se adapta a siembras con rolo y también en siembra directa.	Se utiliza tanto en verdeos como en diferidos.
 V. KATAMBORA	Es el cultivar más tolerante a la salinidad que existe en el mercado.	Prefiere los suelos bien trabajados, aunque se adapta también en planteos de desmonte.	Es importante que la semilla tome contacto con el suelo.	Posee muy buena calidad para el sistema de cría y recría.
	Posee alta tolerancia a la sequía.	Se adapta a siembras primaverales/estivales.		
	Es utilizado en todo el norte del país, especialmente indicada para los bajos submeridionales.			
	Proporciona excelente relación hoja/tallo.			
	Proteína superior al 8% en invierno y 12 % en verano.			
	Excelente producción de materia seca, muy estable en su producción.			

BARLLIDE	Es un cultivar ampliamente probado en nuestro país. Por su condición de tetraploide se aconseja emplearlo en regiones que permitan aprovechar su potencial.	Comparte muchas cualidades de gran parte de las Grama Rhodes, pero se diferencia en que genera menos estolones que Katambora y Pioneer.	Como la mayoría de las Grama Rhodes posee gran versatilidad para la siembra.	Cultivar tetraploide de amplio desarrollo en el NEA Argentino y Paraguay.
 V. CALLIDE	Se lo emplea con muy buenos resultados en Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones.	Mayor productividad que las gramas diploides, aunque requiere ambientes superiores a los 800 mm.	Se adapta a prácticamente todo tipo de siembra, aunque de menor agresividad que Katambora en implantación.	Se lo emplea todo el año aunque su mayor calidad la encontraremos en el período primavera - estival.
		Buen comportamiento en "blanquizales" y suelos con poca estructura.		

ERAGROSTIS CÚRVULA - PASTO LLORON

BARPAL	Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
 V. AGPAL	Forrajera ampliamente difundida en la región medanosa de San Luis y con suelos sueltos en La Pampa.	Se adapta a la misma tecnología que cualquiera de los pastos llorones que podemos encontrar en la República Argentina.	Al igual que los pastos llorones tradicionales, requiere una buena preparación de la cama de siembra.	Barpal es un cultivar que posee características diferenciales a los demás materiales de su especie.
	Su respuesta a condiciones superiores a los 300 mm en combinación con regiones frías lo hace único en su franja.	Siembras tempranas (Agosto a Octubre) o tardías (Febrero) por lo general permiten buena implantación de esta gramínea.	Se adapta a planteos de siembra directa.	Mejor relación hoja/tallo y un ciclo más prolongado lo hacen superior a otras opciones.

"Es el Eragrostis con ciclo más largo del mercado, con gran adaptación a suelos sueltos y climas extremos".



BARMELO				
 V. ERMELO	Rebrota temprano debido a la acumulación de reservas en sus macollos.	Se siembra desde primavera temprana hasta fines de la misma estación.	Se adapta a siembras en línea, tanto en directa como convencional.	Es el cultivar, junto con Tanganica, de mayor difusión en el mercado Argentino.
	Como la mayoría de los Pastos Llorones, rebrota temprano y muestra excelente comportamiento al pastoreo intensivo.	En algunos ambientes con veranos prolongados, puede sembrarse en el mes de Febrero (Ej.: Región serrana del Centro Argentino).	Debido a que es una semilla muy pequeña, la profundidad de siembra debe ser tenida en cuenta y no debería ser superior al centímetro.	Presenta una excelente relación costo, rusticidad y facilidad de implantación.

Megatérmicas

DIGITARIA



DIGIBAR	Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
 V. IRENE	Se emplea en áreas con 450 mm o superiores de precipitación anual.	Siembras tempranas permitirán un arranque temprano con respecto a malezas de comportamiento primavera estival.	Requiere buena preparación de suelo.	Principalmente se la utiliza por su aporte durante el período estival.
	Se adapta muy bien a suelos bien drenados, con bajo potencial y responde muy bien a suelos fértiles.	Es importante el primer verano dejar que se establezca correctamente la pastura.	Debido a que la implantación es lenta, debe generarse una situación de baja competencia.	Gran versatilidad.
	Tolera bajas temperaturas, desarrollándose muy bien en San Luis y La Pampa.		No apta para siembras sobre manto vegetal vivo (Ej.: Rolado).	
	No tolera condiciones de salinidad en el suelo.			

SETARIA



BAROK	Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
 V. NAROK	Requiere precipitaciones superiores a 800 mm/año.	Gramínea perenne de crecimiento cespitoso. Forma macollas hasta de 1 m de diámetro, es rizomatosa y de raíces profundas.	Exige una buena preparación del suelo debido al tamaño de su semilla.	Pastoreo directo.
	Alta resistencia a sequía.	Muy buena persistencia.	Preparar la cama de siembra hasta lograr una buena cama de siembra, lo que proporcionara un mejor establecimiento.	Época de pastoreo casi todo el año con descansos cortos y estratégicos.
	Resistencia a encharcamientos no prolongados.	Ciclo largo, mayor producción de hojas que cv Kazungula.	Profundidad de siembra entre1-2 cm como máximo.	Es la gramínea que primero rebrota en primavera.
	Densidad de siembra 6 kg/ha.	Ideal para suelos pesados y/o anegadizos, de muy buena producción de MS y calidad de forraje media.	El uso del rolo compactador luego de la siembra, mejora el contacto con la semilla y favorece la germinación.	Pastoreo directo o pastoreo rotativo intensivo.
	Ciclo más largo que Kazungula, produce más hojas, es altamente digestible y es más resistente al frío.	Entre los 90 y 120 días se puede iniciar el primer pastoreo.		Resiste altas cargas.
				Gramínea clave para el NEA.

BRACHIARIAS

BARANDÚ

Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
Requiere precipitaciones superiores a 800 mm/año.	Es la Brachiaria más difundida.	Requiere una buena cama de siembra: disco, rolo y nivelar.	Mayormente durante el período de crecimiento que va desde Septiembre a Mayo.
Alta resistencia a Salivazo.	Muy buena persistencia.	Profundidad de siembra no mayor a 2 - 3 cm.	Pastoreo directo.
Buena resistencia a sequía.	Amplio rango de adaptación a suelos de mediana a alta fertilidad y bien drenados.		No la consumen los equinos.
Buena resistencia a frío.	PH 5,0 a 7,0.		
Mediana resistencia a sombreado.	Muy buena relación hoja - tallo.		
Baja resistencia a humedad.	Siembra de Septiembre a Noviembre y en Febrero.		
Densidad de siembra: 7 Kg/ha.	Es de rápida implantación.		
	Primer pastoreo a los 90 días.		

V. MARANDÚ

"Excelente comportamiento en suelos ácidos, con máxima producción estival".



BARDÍCOLA

Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
Requiere precipitaciones superiores a 800 mm/año.	Es una gramínea estolonífera que soporta pastoreo pesado, tolera suelos de baja fertilidad, posee buena tolerancia a la sombra y a zonas bajas con mal drenaje. Su principal limitante es su bajo valor nutritivo.	Requiere una buena cama de siembra: disco, rolo y nivelar.	Mayormente durante el período de crecimiento que va desde Septiembre a Mayo.
Alta resistencia a Salivazo	Adaptación a suelos de mediana fertilidad y a un amplio rango de PH 4,0 a 7,0.	Profundidad de siembra no mayor a 2 - 3 cm.	Se utiliza para pastoreo y control de erosión.
Muy buena resistencia a sequía.	Siembra de Septiembre a Noviembre y en Febrero.		Soporta pastoreo excesivo.
Buena resistencia a frío.	Es de lenta implantación.		Es una gramínea excelente competidora de las malezas.
Buena resistencia a sombreado.	Primer pastoreo a los 180 días.		La consumen los equinos.
Alta resistencia a humedad y encharcamiento.			
Densidad de siembra: 7 Kg/ha.			

V. HUMIDÍCOLA

"Alta productividad en condiciones donde solo ella puede realizarlo".

BRACHIARIAS

BARLEDO



"Excelente producción y seguridad forrajera".

V. XARAÉS

Regímenes de uso

Requiere precipitaciones superiores a 800 mm/año.

Alta resistencia a Salivazo.

Ventajas

- *Alta digestibilidad.*
- *Mayor número de hojas.*
- *Soporta pastoreo intensivo.*
- *Soporta carga animal alta.*
- *Producción de forraje uniforme a lo largo del año.*
- *Se adapta a suelos mal drenados, con fertilidad media y ligeramente ácidos.*
- *Tolerante a plagas y enfermedades.*
- *Tolera hasta 5 meses de sequía.*

Densidad de siembra: 7 Kg/ha.

Implantación Establecimiento

Alta productividad, especialmente de hojas, excelente rebrote. Floración tardía, prolongando el pastoreo.

Es un pasto de muy buena palatabilidad.

Es de mediana exigencia en fertilidad del suelo, intermedia entre el cultivar Marandú y cultivares de Panicum Máximum.

Tolera suelos un poco más pesados que el cv Marandú. A pesar de su buena adaptación a suelos ácidos, se han observado mejores rendimientos en suelos de textura media.

Preparación de suelo

Requiere una buena cama de siembra: disco, rolo y nivelar.

Profundidad de siembra no mayor a 2 - 3 cm.

Utilización

Mayormente durante el período de crecimiento que va desde Septiembre a Mayo.

Pastoreo directo.

La capacidad de carga de Barledo es una de sus ventajas, permitiendo una mayor cantidad de animales por hectárea en pastoreo: 60% más que Marandú, y proporcionando una ganancia de peso anual por área 30% mayor.

No la consumen los equinos.

BARLLANERO



"Ideal para suelos húmedos y sombreados".

V. LLANERO

Regímenes de uso

Requiere precipitaciones superiores a 800 mm/año.

Alta resistencia a Salivazo.

Suelos:

Ácidos con pH entre 4.0 y 7.0.

Tolera suelos arcillosos y arenosos.

Tolerante:

Períodos prolongados de sequía, suelos bien drenados y ligeramente húmedos.

Soporta quemas. Adaptado a los suelos pobres y a suelos húmedos. No tolera encharcamiento prolongado.

Densidad de siembra: 7 Kg/ha.

Implantación Establecimiento

Pasto estolonífero invasor.

Tolerante a la quema y a sequía. Responde a fertilización moderada.

Se maneja con 21-30 días de rebrote.

Buena palatabilidad y digestibilidad (65%).

Es de lenta implantación.

Primer pastoreo a los 180 días.

Preparación de suelo

Requiere una buena cama de siembra: disco, rolo y nivelar.

Profundidad de siembra no mayor a 2 - 3 cm.

Utilización

Pastoreo, control de erosión y protección de taludes.

Alta resistencia al pisoteo.

BUFFEL GRASS

BARTEXAS



V. TEXAS

Regímenes de uso	Implantación Establecimiento	Preparación de suelo	Utilización
Se adapta a regiones y ambientes con precipitaciones superiores a 180 mm anuales.	Desde Octubre a Diciembre en siembras directas o en áreas con labranza vertical. En siembras con rolo en condiciones con cobertura, la siembra se realiza prácticamente todo el año.	Siembras superficiales, como la mayoría de las especies subtropicales.	Se utiliza tanto durante su período de crecimiento (Octubre a Abril), como en pastoreo diferido (Mayo a Septiembre).
Tolera altas temperaturas y períodos de prolongada sequía.	En siembras directas con rolo se prefiere el invierno debido a que estas herramientas trabajan con mayor precisión.	Gran poder de resiembra y preparaciones no muy trabajadas.	Es junto con Gayndah, el Buffel con más tolerancia a la sequía.
Raíces profundas que se pueden prolongar más de 1,5 mts.	5 kg por hectárea permiten una buena cantidad de semilla.	Normalmente este tipo de semilla se siembra en regiones donde la voladura del suelo es común, por lo que NO se recomienda el exceso de laboreo.	

"Excelente para sistemas de producción que buscan seguridad en la producción forrajera".

BILOELA



V. BILOELA

Se comporta mejor en regiones con precipitaciones superiores a los 400 mm anuales.	Siembras con 5 a 6 kg de semilla generan buena cantidad de plántulas que permitirán una correcta implantación.	Al igual que todos los Buffel, requiere de una preparación que genere el menor disturbio en su ambiente.	No soporta condiciones ambientales extremas aunque es más rústico que cualquiera de los Panicum.
Prefiere suelos neutros a alcalinos.	Es esencial, como en la mayoría de los Buffel que la semilla tome contacto real con el suelo.		
Es una excelente alternativa en aquellos ambientes donde Gatton deja de ser una opción válida por el intenso calor y las bajas precipitaciones.			

"Combina la productividad con la seguridad en la producción forrajera".

MOLOPO



V. GAYNDAH

Se adapta a las mismas condiciones de Buffel Texas, aunque prefiere regiones con mejores condiciones climáticas.	3 a 5 kg de semilla son suficiente para una correcta implantación.	Requiere suelos sueltos, aunque no es necesario el excesivo laboreo.	Al igual que a Texas se lo puede utilizar en su período de crecimiento y como diferido.
Es el Buffel con mayor poder de adaptación en su grupo. Ideal para ambientes cambiantes, debido a que combina la rusticidad del Texas y la potencialidad de Biloela o Molopo.	No escapa a las generalidades de la tecnología que se utiliza en este tipo de especies y de los otros cultivares que conviven en su franja de uso.	Se adapta muy bien a la siembra en cobertura, con herramientas de corte, ej.: rolo.	El pastoreo intensivo (sin dañar macollos), es aconsejable para que no se acumule material del ciclo de producción anterior.
		En suelos desnudos asegurar el contacto semilla-suelo.	

"Combina la productividad de Biloela con la estabilidad forrajera de Texas".

ESQUEMA COMPARATIVO MEGATÉRMICAS

BARENBRUG PALAVERSICH

Especie	Variedad	Nombre Comercial	Densidad kg/ha	Precip. mm	Tolerancia Sequía	Tolerancia Salinidad	Tolerancia Encharcam.	Observaciones
Panicum Máximun	Tanzania	BARZANIA	6	> 1000	Buena	Baja	Baja	Productividad y calidad óptima.
	Mombasa	BARBASA	6	> 1000	Buena	Baja	Baja	Altísimas tasas de crecimiento.
	Gatton	BARPANIC	6	> 450	Buena	Baja	Baja	Excelente adaptación a ambientes del norte argentino.
Panicum Coloratum	Klein verde	BARPANICUM	5	> 600	Buena	Buena	Baja	Tolerancia al frío y excelente diferido.
Chloris Gayana	Katambora	BARHODES	6	> 550	Muy Buena	Excelente	Media	La mejor opción para bajos salinos.
	Callide	BARLLIDE	6	> 750	Buena	Muy Buena	Media	Excelente relación hoja/tallo.
Eragrostis Cúrvula - Pasto Llorón	Agpal	BARPAL	3	> 350	Muy Buena	Baja	Baja	Ciclo más largo del mercado.
	Ermelo	BARMELO	3	> 350	Muy Buena	Baja	Baja	Adaptado a climas y suelos extremos.
Digitaria Eriantha	Irene	DIGIBAR	5	> 450	Muy Buena	Baja	Baja	Excelente opción para condiciones extremas.
Setaria	Narok	BAROK	6	> 700	Alta	Baja	Media Alta	Gramínea clave para el NEA. Alta tolerancia al frío.
Brachiarias	Marandú	BARANDÚ	7	> 800	Muy Buena	Baja	Baja	Excelente producción.
	Humidícola	BARDÍCOLA	7	> 800	Muy Buena	Baja	Alta	Seguridad en la producción de forraje.
	Xaraés	BARLEDO	7	> 800	Muy Buena	Baja	Baja	Forraje de alta calidad.
	Llanero	BARLLANERO	7	> 800	Muy Buena	Baja	Media	Alternativa para suelos húmedos y sombreados.
Buffel Grass	Texas	BARTEXAS	5	> 180	Excelente	Media a baja	Baja	Excelente producción y seguridad forrajera.
	Biloela	BILOELA	6	> 350	Muy Buena	Baja	Baja	Combina calidad con tolerancia a la sequía.
	Gayndah	MOLOPO	4	> 300	Excelente	Media	Baja	Mejor relación costo/beneficio.

BARENBRUG
PALAVERSICH

GENÉTICA
DE PUNTA EN TU
CAMPO.

BarPower
SEMILLA POTENCIADA

BIOPOWER

INOCULANTES
PALAVERSICH

Innovación Barenbrug Palaversich. Una empresa del:
ROYAL BARENBRUG GROUP - HOLANDA

Álvarez Condarco N° 612 - Pergamino - Bs. As. - Argentina - Tel.: (02477) 433230
Esmeralda 672 - 10° Piso CABA - Argentina - Tel.: (011) 4322 5586/5520
info@barenbrug.com.ar - www.barenbrug.com.ar